

estão em proporção de 115 : 70 (no operário 105 : 70). Comprimento do gaster 15 mm., largura 5 mm., mais brilhante que a cabeça e o thorax.




Fig. 5 *Dinoponera gigantea* Perty subsp. *nigricolor* Borgm., cabeça da rainha (operário gynaicoide), vista dorsal. — Fig. 6. *Idem*, thorax e pectíolo, vista lateral. — Fig. 7. *Dinoponera gigantea* subsp. *bucki* Borgm., pectíolo do macho, vista lateral. — Fig. 8. *Dinoponera gigantea* subsp. *nigricolor* Borgm., pectíolo do macho, vista lateral. — Fig. 9. *Dinoponera gigantea* subsp. *bucki* Borgm., stipes do apparelho genital do macho, vista lateral esquerda. — Fig. 10. *Ectatomma (Gnamptogenys) mordax* Fr. Smith subsp. *sebastiani* Borgm., operário, pectíolo, vista lateral.
(Borgmeier del.)

MACHO. — Comprimento aproximadamente 16 mm. Brilhante, com pubescência amarela densa. A coloração é inteiramente preta, também as patas e o gaster são pretos. Antennas de cor pardo-vermelha escura; primeiro articulo antennal relativamente um pouco menos comprido que