

Agora o Dr. JONAS MACHADO COSTA a encontrou também em Cruz das Almas perto de São Salvador, Bahia. Pude examinar 1 operário (enviado pelo Dr. COSTA LIMA), J. Machado Costa leg. 3.7.47; e 2 operários, idem, 25.6.48.

Na minha coleção existe material de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba e Chaco. De *nitens* Mayr vi há tempos um cotipo do Museu de Viena.

*Prionopelta* Mayr, 1866

FOREL (1909, p. 242) publicou uma chave das espécies neotrópicas deste gênero. O operário da espécie típica (*punctulata* Mayr) é desconhecido. A única espécie neotrópica descrita desde 1909 é *Prionopelta bruchi* Santschi (fêmea, 1923, Argentina).

Possuo um exemplar de Costa Rica que anteriormente (1937, p. 219) confundi com *P. punctulata* subsp. *antillana* Forel. Trata-se de uma espécie nova, que denomino:

√√ *Prionopelta amabilis* n. sp.

(Figs. 3-5)

Na chave de FOREL (1909, p. 242) chega-se a *mayri* Forel por causa da pilosidade erecta. A espécie nova difere de *mayri* pela face basal do epinoto tão comprida como a face declive; em *mayri*, segundo atesta SANTSCHI (1923, p. 245), ela é menos comprida que a face declive.

*Operário*. — Comprimento aproximadamente 2 mm.; cabeça (incluindo as mandíbulas) 0.6 mm.; tórax e gaster adicionados 1.8 mm. Coloração amarelo-avermelhada. Brilhante. Pilosidade erecta esparsa e curta na cabeça (particularmente nos lados), no escapo, nas tíbias e no tórax; mais comprida e mais abundante no pecíolo e no abdômen. Cabeça além disso com pubescência densa semi-adjacente.

Cabeça (sem as mandíbulas) mais comprida que larga (80:66), anteriormente mais estreita (56) que posteriormente (66), bordas laterais ligeiramente convexas, borda posterior no meio côncava, ângulos posteriores arredondados, ângulos anteriores formando um denticulo muito pequeno. Clípeo com a borda anterior fortemente convexa, crenulada; em cima com duas carenas divergentes, as quais não atingem a borda anterior. Mandíbulas com pontos esparsos e três dentes agudos, dos quais o apical é o mais comprido. Lamelas frontais