

- | | |
|--|--------------------------------|
| 3. Epinoto não tuberculado; nódulo do pecíolo agudamente angulado superiormente (Costa Rica) | <i>horni</i> Menozzi, 1927 |
| — Epinoto tuberculado; pecíolo não agudamente angulado (Panamá) | <i>isthmica</i> Weber, 1940 |
| 4. Lamela clipeal entre as bases antenais denticulada anteriormente (vista de perfil). Operário 1,00 mm. (Guiana Inglesa) | <i>denticulata</i> Weber, 1939 |
| — Lamela clipeal não denticulada anteriormente | 5 - |
| 5. Comprimento da fêmea 1,8 mm. (Argentina) | <i>neotropica</i> Bruch, 1919 |
| — Comprimento da fêmea 1,1-1,2 mm. | 6 |
| 6. Lâmina ventral do pecíolo posteriormente com ângulo reto; altura do pecíolo 0,19 mm.; nódulo com ângulo mais aguçado superiormente; coloração mais clara (Panamá) | <i>humilis</i> Weber, 1939 |
| — Lâmina ventral do pecíolo posteriormente com ângulo agudo; altura do pecíolo 0,21 mm.; nódulo mais arredondado superiormente; coloração mais clara (Trinidad) | <i>icta</i> Weber, 1939 |

Discothyrea neotropica Bruch, 1919

Bruch, 1919, *Physis, Buenos Aires*, vol. 4, pp. 400-403, 3 figs.

Entre material enviado a mim para determinação pelo Dr. KUSNEZOV (Tucumán) encontrei uma fêmea desalada desta espécie de Fronterita, Dep. Famaila, Prov. Tucumán, A. Ares leg. 4.III.1948 (N.º 1201), que concorda perfeitamente com a descrição e as figuras de BRUCH. É o segundo exemplar que se descobriu desta espécie; pertence à coleção do Instituto Miguel Lillo, Tucumán.

Aphaenogaster (s.str.) *araneoides* Emery, 1890

(Figs. 6-7)

Emery, 1890, *Bull. Soc. Ent. Ital.*, vol. 22, p. 48. — 1922, *Gen. Ins.*, p. 65.

Desta espécie recebi há tempos 1 operário e 2 machos de Costa Rica. O macho é indescrito.

Macho. (indescrito) — Comprimento 7 mm. Coloração ferruginosa. O corpo é densa e finamente pontuado, mate; gaster, coxas e fêmures com brilho pouco acentuado. Cabeça posteriormente com estreitamento cônico em forma de colo. Mandíbulas denticuladas. Olhos grandes e fortemente convexos. Colo com estrias finas transversais. Escutelo com algumas rugas longitudinais, crenulado na borda anterior. Pecíolo e postpecíolo como na fig., mais ou menos formados como em *phalangium* Emery (cf. EMERY, 1890, estampa V, fig. 6). O pecíolo é mais comprido que no operário (em *phalangium*, segundo EMERY, menos comprido). Asa com uma célula cubital fechada.

2 machos, de Costa Rica, Hamburgfarm, F. Nevermann leg. 23.VII.1937, de noite no mato, voando. No dia seguinte, o Snr. NEVERMANN encontrou 1 operário no chão, no mato, e observa: "doch wohl dieselbe Art"