

with long hair. Abdomen with the margin of the segments slightly constricted, and rufo-testaceous; the apex of the abdomen and the ventral segments with long fine hair; the peduncle transverse; concave above, the lateral posterior angles prominent and obtuse; the apical segment compressed vertically; the apical ventral plate furnished with two acute, stout, curved spines. Hab. Mexico".

*Cheliomyrmex nortoni* Mayr (1870). — "Cheliomyrmex nov. gen. Operaria: Mandibulae angustae dimidio apicali fortiter curvato, apice acuto margine interno prope basim dente minuto at in medio dente valido. Palpi maxillares 2-, labiales 3-articulati. Caput rotundato-quadratum supra convexus. Clypeus indistinctus. Laminae frontales breves, antice prope oris marginem transversum et rectum in lobum triangularem lateralem dilatatae. Antennae prope oris marginem insertae, 12-articulatae, scapo brevi a basi ad apicem sensim incrassato, funiculo a basi ad apicem sensim paulo incrassato, haud clavato. Area frontalis, sulcus frontalis, oculi et ocelli desunt. Thorax muticus, subquadrilaterus, antice rotundatus, sutura pro-mesonotali nulla, sutura meso-metanotali distincta. Petioli squama incrassata, transversa, mutica, erecta, rotundato-quadrata. Abdomen segmento primo minuto, latitudine pronoti, a supra viso, trapezoideo, strictura a segmento secundo magno separato, segmento tertio secundo paulo minore, quarto minuto et apicali conico aculeum includente. Calcaria tibiarum pectinata. Unguiculi bidentati. — *C. nortoni* nov. spec. Operaria: Long. 7 Mill. Nitida, rufo-ferruginea, antennis pedibusque rufo-testaceis, abdomen postice infuscato; pilosa, pedibus pilis longis abstantibus; superficialiter et subtiliter coriacea. Von Herrn Norton 2 Exemplare aus Mexico erhalten". — (Nach Wheeler wurden die Typen, jetzt im Museum Wien, von Sumichrast gesammelt in der Nähe des Berges Orizaba, Vera Cruz, Mexico).

*Eciton morosum v. payarum* Forel (1899). — "Mâle. Diffère du type par son pédicule beaucoup moins concave et à bord latéral plus obtus, moins proéminent, ne formant pas d'angle postérieur latéral distinct. Je ne trouve pas d'autre différence avec les exemplaires d'Atoyac et ce sont ces derniers que je dois considérer comme typiques, le type de Smith étant de Mexique, et la forme du pédicule correspondant à la description de Smith. Hab. Honduras (Staudinger)".