

***Cheliomyrmex ursinus* Emery ♂**

*Ecton morosum* subsp. *ursinum* Emery, 1901b p. 52 (Maennchen; Brasil).  
*Cheliomyrmex ursinus*, Wheeler 1921 p. 318, 324.  
Referenzen: Emery 1910 p. 23. — Borgmeier 1923 p. 44.

Holotype: Maennchen (wahrscheinlich im Museum v. Paris); "Brasile (coll. André)".

Diese Art, deren Type ich nicht sah, ist durch die kleinen Augen, den stark gewoelbten Thorax und die lange Behaarung ausgezeichnet; letztere erinnert an *Labidus curvipes* Em. und *europubens* Sant., zwei Arten, denen die Gattung *Cheliomyrmex* besonders nahesteht.

**Originalbeschreibung**

*Ecton morosum* subsp. *ursinum* Emery (1901). — "Più grande e robusto del tipo della specie; bruno scuro, mandibole, zampe e margini dei segmenti rossicci; torace poco lucido, addome opaco, finamente pubescente; tutto l'insetto è irta di peli sottili, rossicci, lunghi più di due volte quanto sul tipo e nella var. *payarum* (la lunghezza dei peli del torace è pressochè eguale alla larghezza del femore anteriore). Capo fatto come nel tipo, ma gli occhi sono notevolmente più piccoli, e perciò l'ocello laterale dista dall'occhio quasi quanto il diametro di un ocello. Torace, largo e corto, molto più gibboso d'innanzi che nel tipo, in modo che, veduto di sopra, ricopre quasi tutta la testa. Peziole ritondato lateralmente, senza angoli distinti. Ali molto meno scure che nel tipo, senza riflessi violacei; venatura bruna anzichè picea. Lungh. 20 mm. Brasile, un solo esemplare; coll. André".