

Labidus coecus (Latreille) 24 ♀ ♀ ♂

(Taf. 2 Fig. 4, 8, 10; Taf. 3 Fig. 1-4, 6, 11; Taf. 4 Fig. 9; Taf. 5 Fig. 1; Taf. 6 Fig. 1-16; Taf. 7 Fig. 1-7; Taf. 43 Fig. 19-20; Taf. 58 Fig. 1-4; Taf. 82 Fig. 1-2)

Formica coeca Latreille, 1802 p. 270, pl. 9 fig. 56 (Soldat; "Amérique méridionale").
Nycterasia coeca, Roger 1861 p. 22 (Soldat, Arbeiter; Brasilien).
Ecton coecum, Mayr 1886 p. 119 (Arbeiter); 1887 p. 553 (Soldat). — Bruch 1934a p. 116, fig. 1-5, pl. 1 (Weibchen; Chaco). — Weber 1941 p. 325, 7 fig. (Weibchen; Brit. Guiana). — G. C. Wheeler 1943 p. 332, fig. 24-28 (Larve; Brit. Guiana). — André in Forel 1899a p. 160. — Emery 1900a p. 517. — Wheeler & Long 1901 p. 158. — Wheeler 1908b p. 408, pl. 26 f. 3. — Emery 1910 p. 22. — Forel 1912 p. 43. — Mann 1916 p. 421. — Gallardo 1920 p. 326, fig. 11-12. — Luederwaldt 1920a p. 243, 253; 1926 p. 246 (Biol.). — Borgmeier 1923 p. 41; 1936 p. 57; 1948c p. 439. — Werringloer 1932 p. 482, 501, fig. 30, 39 (Augen). — Weiler 1936 p. 18 (Fuehler). — Eidmann 1936 p. 28 (Biol.). — Creighton 1950 p. 62. — M. R. Smith 1947 p. 526 fig. 1; 1951 in Muesebeck p. 779.
Formica omnivora Olivier, 1791 p. 496 (Arbeiter; Cayenne) [nec Linné].
Ecton omnivorum, Emery 1891 p. 163; 1894a p. 179, pl. 2 fig. 9 (Arbeiter, Soldat, Maennchen); 1895b p. 258 (Arbeiter, Maennchen).
Labidus latreillii Jurine, 1807 p. 283 (Maennchen; Surinam). — Latreille 1809 p. 123 (Cayenne). — Shuckard 1840 p. 199. — Westwood 1842 p. 75. — Emery 1894a p. 180; 1895b p. 258.
Labidus jurini Shuckard, 1840 p. 198 (Maennchen; Demerara, Brit. Guiana). — Westwood 1842 p. 75. — Fr. Smith 1859 p. 5, pl. 2 fig. 1. — Emery 1900a p. 517; 1910 p. 22. — Forel 1912 p. 43. — Gallardo 1920 p. 332.
Labidus servillei Westwood, 1842 p. 75 (Maennchen; Belém, Pará). — Fr. Smith 1859 p. 5 pl. 2 fig. 10. — Emery 1900a p. 517. — Forel 1912 p. 43. — Gallardo 1920 p. 330. — Santschi 1920 p. 368. — Borgmeier 1953 p. 17.
Mutilla (*Labidus*) *fulvescens* Blanchard, 1849 in Cuvier pl. 118 fig. 2.
Labidus saji (*sayi*) Haldeman, 1852 p. 367 pl. 9 fig. 1-3 (Maennchen; Fort Gates, Tex., testa M. R. Smith 1842 p. 577). — Emery 1894a p. 180. — Santschi 1923b p. 1261 (*coecum* var.).
Labidus atriceps F. Smith, 1859 p. 5 pl. 2 fig. 4 (Maennchen; Ega). — Forel 1911b p. 236. — Borgmeier 1923 p. 41.
Labidus pilosus F. Smith, 1859 p. 7 (Maennchen; S. Paulo).
Labidus panzeri F. Smith, 1859 p. 72 pl. 2 fig. 2 (Maennchen; Colombia). — Emery 1910 p. 27. — Borgmeier 1953 p. 16.
Ecton vastator F. Smith, 1860 p. 71 (Arbeiter; Ega). — Bates 1863 ed. 1921 p. 367 (Biol.).
Ecton erratica F. Smith, 1860 p. 71 (Arbeiter; Ega).
Myrmica rubra Buckley, 1867 p. 335 (Arbeiter; Texas). — Emery 1895b p. 258.
Pseudodichthadia incerta André, 1885 p. 838 fig. 1-5 (Weibchen; Tupatáro, Guanajuato, Mexico); in Forel 1899a p. 160. — Bruch 1934a p. 117.
Ecton smithii Dalla Torre, 1892 p. 89 (nov. nom. pro *L. pilosus* Smith).
Ecton nigrita Emery, 1901a p. 52 (Maennchen; Guatemala) [n. o. v. syn.]; 1910 p. 23. — Santschi 1924a p. 11 (*praedator nigrita*). — Borgmeier 1938 p. 58; 1953 p. 6.
Ecton coecum v. *bitoba* Emery, 1901a p. 51 (Maennchen; Paramba, Ecuador); 1910 p. 22. — Borgmeier 1953 p. 16.
Ecton coecum subsp. *kulowi* Forel, 1901a p. 47 (Maennchen; Soconusco, Mex.).
Ecton setosi Forel, 1904 p. 169 (Arbeiter; Espírito Santo, Brasil). — Santschi 1916 p. 368 (Paraguay); 1923b p. 1260 (Blumenau) (*coecum* var.).
Ecton grassator Forel 1911a, p. 288 (Arbeiter; S. Paulo).
Ecton (*Labidus*) *coecum* v. *grassator*, Santschi 1923 b p. 1260 (Blumenau; Bolivia). — Wheeler 1925a p. 2 (S. Leopoldo, R.G.S.).
Ecton (*Labidus*) *coecum* subsp. *servillei* v. *hostilis* Santschi, 1920 p. 368 (Maennchen; Nouveau Chantier, Fr. Guiana). — Borgmeier 1953 p. 14.
Ecton (*Labidus*) *coecum* v. *spacifrons* Wheeler, 1921 p. 310 (Arbeiter; Pará). — Borgmeier 1953 p. 19.
Ecton (*Labidus*) *coecum* v. *elsbethae* Forel, 1922 p. 91 (Maennchen; Rio Frio, Colombia).
Ecton (*Labidus*) *serpentis* Weber, 1938a p. 209 (Arbeiter; Brit. Guiana) [n. o. v. syn.].