

to più debolmente incavato, benchè a questo riguardo sia alquanto variabile. Lungh. 18 mm. Ala anteriore $15\frac{1}{2}$ -16 mm. Ecuador: Paramba, 2 esemplari, coll. André. — Se si confrontano molti maschi dell'*E. coecum* di diverse località si vede che la forma del clipeo è incostante. Da un margine anteriore appena arcuato, come si vede negli esemplari del Texas (*Sayi*) e in alcuni individui della var. *Jurinei*, si passa per gradi insensibili a forme che hanno un incavo profondo, come alcuni della var. *Servillei*. La var. *biloba* è una forma estrema della specie".

Eciton nigrita Emery (1901). — "Specie molto affine all'*E. coecum*. Peli e scultura come in quella specie; ne differisce pelo colore tutto piceo, con le mandibole e le zampe appena un poco più chiare, il funicolo ferrugineo. Forma più gracile che negli esemplari più snelli della var. *Servillei*, e anche più gracile della stessa var. *biloba*. Capo più piccolo, più ritondato di dietro che nell'*E. coecum*, con gli occhi meno grandi, per cui gli ocelli rimangono più distanti da essi. Clipeo debolmente e largamente sinuato nel mezzo. Mandibole più corte e più robuste che nell'*E. coecum*, lamine frontali molto sporgenti, scapo delle antenne più lungo relativamente al capo ma non assolutamente. Torace stretto e lungo, con linea media del mesonoto fortemente impressa. Peziole, addome e forma dei tarsi posteriori come nell'*E. coecum*. Ali molto corte, fortemente affumicate, con venatura bruna. Lungh. $18\frac{1}{2}$ -19 mm. Largh. del torace $3\frac{1}{5}$, Ala ant. 14 mm. — Guatemala; un esemplare; coll. André".

Eciton coecum subsp. *kulowi* Forel (1901). — "Maennchen. L. 19 mm. Beim ersten Blick dem *E. morosum* aehnlich, und doch total verschieden. Mandibeln ziemlich flach und breiter als beim Typus, von der Basis bis zum Ende stark gekruemmt, ziemlich lang, fast so breit gegen das Ende wie an der Basis, mit kurzer, etwas stumpfer Spizze, glaenzend, ziemlich stark, aber weitlaeufig punktiert und stark braun abstehend behaart. Clypeus in der Mitte des Vorderrandes tief und breit ausgerandet. Stirnleisten hoch, noch hoher wie beim Typus. Der Kopf etwas weniger breit und die Augen etwas kleiner als beim Typus der Art. Der ganze Koerper schwarzbraun, so dunkel wie *E. morosum*, var. *payarum*; nur die Fuehlergeissel rostgelbbraun. Beine, Fuehlerschaft und Mandibeln braun. Fluegel nur wenig dunkler als beim Typus der Art. — Soconusco (Chiapas) 1120 m ueber Meer in Mexico (Herrm. und Hans Kulow). Viel dunkler noch als die r. *Servillei* Westw.".

Eciton selsyi Forel (1904). — "Ouvrière. Long. 3 à 3,7 mill. Mandibules larges, triangulaires, ayant, outre la dent apicale, deux ou trois fortes dents et des denticules intermédiaires distincts sur le bord terminal; enfin, une dent sur le bord interne, près du bord terminal. Elles sont subopaques, finement striolées, avec de gros points épars. Tête plus longue que large, rectangulaire chez la plus petite ouvrière, en trapèze chez la plus grande, élargie devant, rétrécie derrière, comme chez une *Anomma*, à bord postérieur presque droit (plutôt légèrement concave), arrondi, sans trace de prolongement aux angles occipitaux qui sont arrondis. L'ocelle latéral est fort petit, situé en arrière du milieu des côtés. Scapes épais, atteignant le tiers postérieur de la tête. Funicules assez épais; tous leurs articles bien plus épais que longs, sauf le premier et le dernier. Arêtes frontales convergeant en arrière où elles se touchent presque. Thorax à peu près comme chez l'*opacithorax*, avec un faible abaissement arrondi derrière le mésonotum. Métanotum muti-