

102 pag. 6: Etwa so lang als breit, cr. 1.7 mm., aber hinten gerundet; oben und unten dicht kurz, gelblich behaart. Alle fuenf Rueckenplatten mit einer Gruppe feiner, ziemlich dicht stehender Punkte in ihrer Mitte. Bauchplatten quer. Die erste Platte mit ziemlich geradem Hinterrande. Die vier folgenden Segmente mit tief winklig ausgerandetem Vorderrand; Hinterrand des zweiten Segmentes fast gerade, mit dreieckigem Fortsatz in der Mitte; der des dritten schwach und der des vierten sehr deutlich winklig ausgerandet. Die letzte Bauchplatte nach hinten stark verengt, herzfoermig; auch der kurze Hinterrand mit tiefem, winkligem Ausschnitt; auf ihrer Flaeche mit seichtem Eindruck. Alle fuenf Ventralplatten fast ganz unskulpturiert. Der Stachel ist sichtbar, seine beiden Borsten ueber 1 mm. lang. Beine, im Vergleich zu denen des Arbeiters, sehr kurz und sehr breit, an allen Femoren und Tibien seitlich stark zusammen gedrueckt. Letztere kuerzer als die ersten, ziemlich gleichbreit, nur wenig nach vorn verschmaeler, etwas gebogen, mit einem langen Dorn am Ende. Alle Fuesse 5-gliedrig. Alle Klauen einfach, nur mit Haftlappen. — Farbe glaenzend braun an Kopf, Thorax, Petiolus und den Dorsalplatten; gelbbraun an den Antennen, Tastern, Beinen, Ventralplatten und der Oberlippe. Verbindungshaeute des Abdomens weiss, glanzlos. Antennen und Beine kurz und ziemlich anliegend behaart; sonst die Bekleidung sehr unscheinbar. — Ypiranga, 23.X.16., im botanischen Garten des Museu Paulista, in einem verlassenen Bau von *Cornitermes* sp., welcher von den Ameisen in Besitz genommen war". — [Man vergleiche hierzu die Abbildungen bei Bruch, 1921].

*Eciton (Labidus) praedator* v. *guianense* Wheeler (1921). — "E. *praedator* is not common at Kartabo, and the few foraging colonies I encountered were much smaller than those described by Bates and Mann. Moreover, they belonged to an undescribed variety which I shall call *guianense* var. nov. The soldier of this form is smaller than the type and measures only 7,5-8,5 mm; head 3-3,5 mm (typical form 8,5-11,5 mm). The upper surface of the head is decidedly more opaque, very finely, densely and evenly punctate or reticulate, with the larger, sparser, piligerous punctures more indistinct. The body is paler, being dull ferruginous, with pale brown legs and blackish gaster. The worker, however, is darker and colored more like the typical form, but the head is somewhat less shining above. Though considerably darker, *guianense* approaches the subspecies *emiliae* Mann in color, but is much closer to the type. In the soldier *emiliae* the head is more finely and more indistinctly sculptured and somewhat glossy and the gaster and sides of the thorax are less shining. The var. *ferruginea* Norton from Mexico is probably closely allied to *guianense* but was inadequately described. Santschi has based a subsp. *europubens* on male specimens from French Guiana and this may prove to be covarietal with my soldiers and workers from Kartabo. In my collection there are a few soldiers and workers taken by Forel at Esperanza, Colombia, which also belong to the var. *guianense*".

*Eciton (Labidus) sedulus* Menozzi (1926). — "Maschio. Rosso-giallastro, zampe ed antennae un poco più chiari, fronte ed occipite bruni. Pubescenza piuttosto scarsa e solamente nelle appendici, nei fianchi del torace e nel peziolo, nel gastro essa è alquanto più fitta ed anche più lunga, particolarmente negli ultimi segmenti. Peli dritti di colore rosastro, assai lunghi e numerosi nelle mandibole, nella parte anteriore del capo, sul torace, eccetto i fianchi, e negli angoli anteriori del peziolo; nel gastro tali peli sono pure presenti ma radi e limitatamente