

Untersuchtes Material. — 1 Maennchen (Holo-type) von Chirripó, Costa Rica (A. Brade V.1896); 1 Maennchen von Irazú 6-7000 ft., Costa Rica (H. Rogers; Mus. Genf); 1 Maennchen von Balzapamba, Ecuador (R. Haensch; Mus. Genua).

Verbreitung. — Costa Rica; Ecuador.

Variation. — Das Maennchen von Balzapamba hatte Emery als "curvipes var." bezettelt. Es scheint etwas kleiner (Fluegel 15 mm), aber die Kopfbreite ist dieselbe. In der Faerbung weicht es stark ab. Stirn schwarz, Beine und Geissel rostgelb. Thorax braun; Pronotum vorn hellbraun, Hinterrand geschwaerzt; Mesonotum mit drei breiten schwaerzlichen Streifen. Epinotum gelbbraun. Gaster dunkelbraun. Fluegel stark gebraeunt, mit blaeulichen Reflexen. Hinterschiene schmaler und weniger gebogen; Laenge 2,8 mm. Die Genitalien dieses Exemplares habe ich nicht untersucht. Es ist moeglich, dass es sich um eine geographische Rasse handelt; man muss mehr Material abwarten, um das beurteilen zu koennen.

Diskussion. — *L. curvipes* steht *europubens* Sant. am naechsten, ist aber leicht unterscheidbar durch den stark konvexen Clypeus, die kleineren Augen und Ocelen und die staerker gebogenen Mandibeln. Die Genitalien sind sehr aehnlich, aber der Stipes hat andere Umrisse, und die Sagitten sind im Profil hinten nicht S-foermig, sondern konkav. Die Faerbung ist gaenzlich verschieden, und die Behaarung ist weniger lang als bei *europubens*.

#### Originalbeschreibung

*Eciton curvipes* Emery (1900). — "Maschio. Bruno scuro, poco lucido, zampe più chiare, scutello, parti posteriori e inferiori del torace e peziolo più lucide e bruno ferrugineo, mandibole ferruginee, flagello e tarsi testacei. Capo, torace, zampe e peziolo copiosamente e lungamente pelosi, gastro in parte solo pubescente, con molti lunghi peli alla faccia inferiore e alla estremità. Capo e torace sottilmente punteggiati, con punti piligeri più grandi. Capo trasversalmente ovale, la faccia anteriore debolmente convessa, clipeo con margine anteriore arcuato, sporgente fra le mandibole. Queste sono piate, strette, senza denti, curve più debolmente alla base, più fortemente, come ad uncino verso l'estremità. Occhi e ocelli relativamente piccoli. Antenne corte. Torace poco più largo del capo, mediocremente convesso innanzi; epinoto troncato obliquamente indietro. Zampe lunghe e robuste, tibie posteriori compresse, fortemente curve, ciliate al margine inferiore. 1º articolo del tarso più grosso alla base che all'apice. Peziolo trapezoide con angoli posteriori molto sporgenti e faccia superiore fortemente incavata. Ali brune con venatura scura. L. 15 mm. — Costa Rica (Alfaro) un esemplare nella mia collezione. Differisce da tutte le altre specie pel margine arcuato del clipeo. Sospetto che possa essere il maschio dell'*E. crassicornis*. Certamente appartiene al sottogenere *Eciton* propriamente detto (operarie con unghie dentate)".