

luteous pubescence, it is scarcely broader than the head, and not gibbous in front; the abdominal peduncle is subtriangular, the sides very much elevated, the hind angles acute and produced; the extremity of the abdomen is deflexed; the antennae and legs are long and slender; the femora blackish; the tibiae pitchy, but on the upper side reddish; the tarsi testaceous, the posterior tibiae and tarsi slender, the tarsi having a minute tubercle at the base, within; the wings are very slightly stained with brown, and almost hyaline, the veins brown; the marginal cell is angulated behind, and the cubital vein is not thickened behind the second submarginal cell".

*Eciton foreli* Mayr (1886). — "Arbeiter: Der Knoten des ersten Stielchengliedes gerundet-quadratisch, oben nicht laenger als breit, das zweite Glied hoechstens so lang als hinten breit. Die Mandibeln gar nicht gestreift mit schneidigem, ungezahnten Kaurande; die Basalflaeche des Metanotum jederseits von einem Laengskiele begrenzt; beide Kiele enden in je einen meist stumpfen dreieckigen Zahn, welcher sich nicht ueber das hintere Ende der Basalflaeche fortsetzt. Die groesseren Arbeiter sind braunlichgelb oder braun mit hellerem Kopfe, die kleineren braun oder schwarzbraun oft mit gelbrotem oder rotbraunem Hinterleibe; die Fuehler, besonders der Schaft, und die Mandibeln schwarzbraun. Laenge 6-11 mm.". — "Soldat: Vorherrschend gelb oder rotgelb, die Fuehler, besonders der Schaft und die Mandibeln braun; die Basalflaeche des Metanotum mit zwei hinten breiteren Laengsleisten, welche am hinteren Ende in zwei dreieckige, nicht oder wenig spitze Zahne sich erweitern und erst auf der abschuessigen Flaeche des Metanotum sich mehr oder weniger mitsammen verbinden; die obere Flaeche des ersten Knotens quadratisch, sie bildet mit der zum Thoraxgelenke schief herabziehenden Flaeche einen stumpfen Winkel, der zweite Knoten nicht schmaeler als lang. Laenge 13 mm.". — "Mexico, Panama, Neugranada, Cayenne, Brasilien, Uruguay. *E. hamata* Smith T. E. S., N. S. III, pag. 161 (teilweise), Cat. Hym. Brit. M. VI, pag. 148; *E. rapax* Sm. pag. 161 (teilweise), Cat. Hym. Brit. M. VI, pag. 163 Arbeiter min., Mayr, Novara Reise Tr. E. S., N. S. III, pag. 163 Amer. Ent. Soc. 1868 und Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, pag. 45. *E. brunnea* Norton ebenda (?)".

*Eciton burchelli* var. *parvispina* Forel (1899). — "Variété peu caractérisée dont les épines du métanotum sont réduites à deux petites lamelles peu développées. Hab. Guatemala, Retalhuleu (Stoll)".

*Eciton burchelli* subsp. *urichi* Forel (1899). — "Je fonde cette race sur des exemplaires récoltés à Trinidad par M. Urich, et qui se distinguent par leur taille peu variable (3.8 à 8.2 millim.), petite, et par leur couleur. Ils sont d'un brun noir, avec le pédicule et l'abdomen ainsi que les tibias et les tarses postérieurs d'un jaune d'ocre. Le métanotum, les funicules, les cuisses postérieures et les autres pattes sont d'un brun plus ou moins roussâtre. Hab. Trinidad (Urich)".

*Eciton burchelli* var. *infumatum* Wheeler (1909). — "Worker. Differing from the typical *burchelli* in color. The body is black, with the articulations of the legs, the tarsi, tips of the antennal scapes, inner border of mandibles, the clypeus and posterior border of the gastric segments deep red. Soldier. Head brownish yellow, excepting the clypeus, cheeks and mandibles, which are blackish. Thin anterior border of clypeus yellowish. Anterior portion brown. Legs, petiole, postpetiole and gaster chocolate brown, antennae darker. In some