

ausgehoehlten Koerper an den Fuehlern und Schenkeln der Ameisen schmarotzen, wie ihr Name andeutet: *Antennequesoma reichenbergeri* und *Coxequesoma collegianorum*; merkwuerdig ist, dass sie in Faerbung und Skulptur ihren Wirten gleichen.

#### Eine neue Rasse von *Eciton quadriglume*

Eine geographisch und morphologisch gut differenzierte Unterart von *quadriglume* liegt mir in den oben bereits erwae hnnten Maennchen aus Peru und vom Amazonas vor, die an dem abgerundeten Innenzahn der Mandibeln und dem rostrottem Gaster leicht kenntlich ist. Ich lasse sie vorlaeufig unbenannt, gebe aber die hauptsaechlichen Unterschiede von der typischen Form.

Maennchen (Taf. 16 Fig. 6; Taf. 62 Fig. 3). — Kopf breiter (3,6 mm). Augen kleiner (Laenge 1,4 mm; Breite 0,92 mm). Breite des vorderen Ocellus 0,44 mm. Schaft 1,88 mm lang. Laenge der Mandibeln 2,2 mm; der Innenzahn nahe der Basis ist apikal abgerundet. Furche des Scutellums flacher. Petiolus schmaler (Breite 2,6 mm), parallel seitig, dorsal weniger ausgebuchtet, Hinterecken nicht verlaengert und sehr stumpf. Fluegel staerker gebraeunt, Laenge 17,5 mm.

1 Ex. von Satipo, Peru [Paprzycki 20.III.41]; 1 Ex. von Tingo Maria, Peru [Weyrauch 1940]; 1 Ex. vom Amazonas [Goeldi; in Coll. Forel, als *rapax* F. Sm. determiniert].

#### Originalbeschreibungen

*Atta quadriglumis* Haliday (1836). — "Nigra, obscura; ano rufo; occipite et metathorace bispinosus. Aculeata. Long. corp. 5 lin. Aculeata. Insectum singulare nec *Atta* genuina ob antennas et unguis difformes. Nigra, obscura, sparsim villosa, tarsis piceis. Antennae solito crassiores, articulis valde distinctis, secundo intra primum fere retracto. Caput ovatum, occipite bispini. Frons linea longitudinali impressa. Oculi minutissimi, punctiformes, fulgidi. Mandibulae trigonae, decurvae. Palpi nulli. Metathorax bispinosus. Segmentum petiolare primum gibbum, lateribus compressum, basi subtus mucrone tenui ferrugineo instructum; secundum nodosum, basi inferne subtiliter retrocuspidatum; segmentum tertium, campanulatum, abdominis tres partes occupans. Anus ferrugineus, manifeste aculeatus. Pedes longi, validiusculi, calcaria numero 1 : 2 : 2, parium posteriorum tenuissima, subulata. Ungues bidentes. — Taken at Rio de Janeiro and also at St. Catherine's by Lieut. Graves. This species cannot be referred without violence to any of the established genera of Ants; but I am not sufficiently acquainted with the family to attempt characterizing the group to which it belongs".

*Labidus latreillii* Lepeletier (1838). — "Labidus Latreillii Jurine, Méth. Hymén. p. 283. Rufo-fusco-hirtus, capite thoraceque et femoribus nigris, caetera rufo-fuscus, abdomine supra rufo-sericeo. Tête et antennes noires. Mandibules brunes noirâtres. Corselet noir; métathorax prolongé