

sur les côtés, dans leur milieu, en une pointe mousse. Abdomen, jambes et tarses d'un brun roussâtre. Premier segment de l'abdomen creusé en dessus en gouttière; ses côtés élevés en une carène qui se prolonge postérieurement en pointe. Tout l'insecte chargé de grands poils roux hérissés, à l'exception du dessus des second, troisième, quatrième et cinquième segments de l'abdomen, et de la base du sixième, qui n'ont pas de poils hérissés, mais qui sont couverts d'un duvè roux soyeux, très court et couché, qui ne paraît guère que par son reflet setiné. Cuisses noirâtres. Ailes d'un transparent jaunâtre; nervures d'un jaune roussâtre. Mâle. Longueur, environ 14 lig. — Amérique: Brésil, province de Sainte Catherine, aux bords de la mer".

*Labidus fargeavii* Shuckard (1840). — "Length 14 lines. Rufo-fusco-hirtus, capite thoraceque et femoribus nigris, caetera rufo-fuscus, abdomine supra rufo-sericeo. *Labidus Latreillii*, St. Fargeau, Hist. Nat. des Hymenopt. (Suites à Buffon), tom. I. p. 229. I. "Head and antennae black. Mandibles brown black. Thorax black; metathorax prolonged in the centre of its sides into an obtuse point. Abdomen, legs, and tarsi reddish brown. First segment of the abdomen furrowed longitudinally above; its sides raised into a carina which terminates posteriorly in a point. The whole insect enveloped in long reddish upright hair, excepting the back of the 2-5 and base of the sixth segments of the abdomen, but which are covered with a close decumbent reddish silky down. Femora blackish. Wings of a reddish yellow". I have not seen the preceding insect, but a comparison of its description, which is verbally translated above, with the next but one [*Labidus jurinii* Shuck.], which is the genuine *Lab. Latreillii*, will distinctly show that they must be different, and that the present one was incorrectly attributed. I have consequently given it the name of its distinguished describer. It is apparently the largest in the genus".

*Ecton lugubris* Roger (1863). — "Arbeiter 10-11 Millim. lang, ganz schwarz, matt, doch sind die Hueften, Gelenke, Beine und der Hinterleib, besonders die Spitze, stellenweise rotbraun. Der Koerper hat ueberall schwarze, abstehende Haare in maessiger Menge. Der Kopf ist hinten verengt, gerandet und hat an den Hinterecken 2 feine, spitzige Dornen. Die Stirn ist in der Mitte laengs eingedruect, gelblich. Augen glasig, gelbraun, klein. Fuehlerschaft an der Basis schwaecher als an der Spitze. Die Fuehlergeissel ist an der Unterseite grossenteils gelblich rot. Die Stirniamellen sind nicht nahe an einander, hinten eckig vorspringend, vorn stark divergirend und in den untern Fuehlergrubenrand umgebogen. Clipeus vorn schwach dreieckig, quer eingedruect, gelblich. Mandibeln dreieckig, gegen die Spitze stark nach unten gekruemmt, vorn am Schneiderand, wo ein kraeftiger Zahn sitzt, glaenzend, sonst fein lederartig gerunzelt mit zerstreuten Punkten und wenig Glanz. Kopf dicht fingerhutartig punktirt mit einzelnen sehr flachen, grossen Punkten. Das Metanotum ist nach hinten verschmaelerl, seitlich scharf gerandet und endet in 2 maessig lange, ziemlich nahe beisammen sitzende, nach oben und hinten gerichtete Dornen. Das Metanotum ist oben groeber gerunzelt, der uebrige Thorax fingerhutartig punktirt. Der erste Knoten ist von oben besehen cylindrisch, laenger als breit, vorn etwas verschmaelerl, von der Seite besehen, von vorn nach hinten bogenfoermig. Unterseite ohne Zahn. Zweiter Knoten hinten breiter als vorn, der untere Vorderrand zahnfoermig. Knoten und Abdomen fingerhutartig punktirt. Beine lang. — Brasilien".