

Bruch (16.II.1916) fand einige Maennchen von *N. pertyi* am Eingang des Nestes in Tornquist, Sierra de la Ventana, Prov. San Luis. (Bruch 1916, p. 225, nota 1: "strobel")

P. W. Fattig (3.VI.1916) fand gefl. Maennchen von *N. carolinensis* in Atlanta, Georgia, Nest in "oak stump". Nach 3 Ex. ex coll. USNM. Wm. Beebe (20.VII.1920) fand Maennchen, "partially delated", von *N. pilosus beebei* in Kartabo, Brit. Guiana; "nest in huge log". (Wheeler 1921, p. 312)

V. Weiser (12.XI.1920) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. pertyi* in Punta de Balasto, Catamarca; das Nest befand sich 50 cm tief in der Erde, die Kammer war 20×10 cm gross. (Bruch 1921, p. 176 "strobel")

J. Hubrig (II.1922) fand zahlreiche reife Maennchen-Puppen von *N. raptans* im Nest in Alta Gracia, Cordoba (vidi!). (Bruch 1924, p. 232 "hetschkoii")

V. Weiser (VII.1923) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. raptans* unter gefallenem Baum in Fives Lille, Santa Fé. (Bruch 1924, p. 232 "hetschkoii")

W. M. Mann (XII.1923) fand ein Weibchen von *N. nigrescens* "under stone" in Guadalajara, Jalisco, Mex. (Mann 1926, p. 99 "sumichrasti")

Bruch (1.II.1927) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. pseudops* in Alta Gracia, Cordoba (vidi!). (Bruch 1928, p. 353 "pseudops grandipseudops")

A. Coussio (17.III.1927) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. pseudops* im Zuge in Alta Gracia, Cordoba (vidi!). (Bruch 1928, p. 355 "pseudops grandipseudops")

A. Hansen S. J. (2.XI.1927) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. angustinodis* in Parecy Novo, Rio Grande do Sul; Nest unter Stein. (Borgmeier 1930, p. 25)

M. Silva Fontes (1928) fand 5 gefl. Maennchen von *N. spinolai* im Zuge in Gaspar, S. Catarina. (Borgmeier 1936, p. 62 "punctaticeps")

Rev. P. Schwarzmaier (21.XI.1928) fand 8 gefl. Maennchen von *N. diana*; Nest in Termitenbau. (Borgmeier 1933b, p. 161)

C. Pierzan (14.I.1929) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. legionis* in Rio Negro, Paraná. (Borgmeier 1930, p. 23)

M. Witte (1929) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. legionis* in Rio Negro, Paraná; Nest im Stamm von *Phoebe*, in 7 m Höhe. (Reichensperger 1930, p. 321)

E. Read (27.V.1932) fand Maennchen und Weibchen von *N. carolinensis* in copula im Nest; Spartanburg, South Carolina. (M. R. Smith 1942, p. 538, 566)

A. Ogloblin (2.X.1932) fand 2 kontrahierte Weibchen (vidi!) von *N. hetschkoii* in Loreto, Misiones; Nest unter einem Stein. (Bruch 1934a, p. 128 "hetschkoii ogloblini")

A. Ogloblin (1932) fand ein kontrahiertes Weibchen (vidi!) von *N. raptans* in Loreto, Misiones. (Bruch 1934a, p. 128)

Schwarzmaier (11.I.1934) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. pseudops* in Campinas, Goiás. (CTB Nr. 5544)

Schwarzmaier und Borgmeier (12.I.1934) fanden ein physogastrisches Weibchen von *N. diana* in einem Termitenbau; Campinas, Goiás. (Borgmeier 1939, p. 409)

Schwarzmaier (II.1934) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. pseudops* in Campinas, Goiás. (CTB Nr. 5537)

Schwarzmaier (20.IV.1934) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. pseudops* in Campinas, Goiás. (CTB Nr. 5519)