

- Schwarzmaier und H. de Sousa Lopes (30.XII.1935) fanden ein kontrahiertes Weibchen von *N. minensis* in einem Termitenbau; Campinas, Goiás. (Borgmeier 1939a, p. 411)
- Schwarzmaier (6.V.1936) fand ein Weibchen von *N. pseudops*; Campinas, Goiás. (CTB)
- Schwarzmaier (20.IX.1936) fand ein Weibchen von *N. pseudops* in Campinas, Goiás. (CTB)
- Schwarzmaier (30.X.1936) fand 9 gefl. Maennchen von *N. pseudops* in Campinas, Goiás; Nest in Termitenbau. (Borgmeier 1939a, p. 408)
- T. F. Musselman (1937) fand Maennchen u. Arbeiter von *N. nigrescens* in Quincy, Illinois. (M. R. Smith 1942, p. 553)
- Schwarzmaier (15.III.37) fand ein Weibchen von *N. pseudops*; Campinas, Goiás (CTB).
- H. Schmidt (1937) fand ein Weibchen von *N. humilis* in San José, Costa Rica. (CTB, von Reichensperger erhalten)
- H. Schmidt (1.I.1938) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. pilosus mexicanus* im Zuge, La Caja, Costa Rica. (Reichensperger 1939b, p. 298 "pilosum")
- H. Schmidt (1938) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. alfaroi* in San José, Costa Rica. (Borgmeier 1949b, p. 202)
- L. G. Wesson (XI.1939) fand Maennchen u. Arbeiter von *N. nigrescens* bei Nashville, Tenn. (M. R. Smith 1942, p. 554)
- Schwarzmaier (3.I.1940) fand ein ungefluegeltes Maennchen von *N. pilosus* im Zuge; Pindamonhangaba, S. Paulo. (Borgmeier 1953, p. 5)
- H. Schmidt (1940) fing Arbeiter, 15 Maennchen und 9 maennliche Puppen von *N. humilis* in einem Raubzuge von *Ecton vagans*; San José, Costa Rica. (Borgmeier 1948a, p. 197)
- H. Schmidt (1940) fand 4 Weibchen (aus 4 Kolonien) von *N. humilis* in San José, Costa Rica; ein Ex. war physogastrisch. (Borgmeier 1948a, p. 197)
- H. Schmidt (1940) fand 15 frisch geschluepfte Maennchen und 65 maennl. Puppen von *N. opacithorax*; in einer zweiten Kolonie fand er noch 7 maennl. Puppen; San José, Costa Rica. (Borgmeier 1948a, p. 193)
- H. Schmidt (1940) fand 5 Weibchen (aus 5 Kolonien) von *N. opacithorax*; San José, Costa Rica. (Borgmeier 1948a, p. 193)
- E. L. Bissell (10.IV.1943) fand ein Weibchen von *N. carolinensis* in Camp Thunder, Ga. (USNM, vid! Von M. R. Smith nicht erwähnt)
- H. Schmidt (1944) fand ein Weibchen von *N. humilis* in San José, Costa Rica. (CTB, von Reichensperger erhalten)
- T. C. Schneirla (19.I.1948) fand ein kontrahiertes Weibchen von *N. gibbatus* in Barro Colorado Island, Canal Zone. (Borgmeier 1953, p. 46)
- N. Kusnezov fand zahlreiche Maennchen im Nest von *N. raptans*; Argentinien, Salta, Parque Nacional Finca El Rey (Nr. 8342).
- Rev. W. Kempf (15.XI.53) fand gefluegelte Maennchen von *N. pseudops* im Nest; Agudos, São Paulo.
- H. Schmidt (Datum?) fand ein physogastrisches Weibchen von *N. spinolai* in San José, Costa Rica. (CTB, von Reichensperger erhalten)
- A. C. Cole (Datum?) fand ein Weibchen von *N. carolinensis* in Cades Cove, Tenn. (M. R. Smith 1942, p. 566)
- M. R. Smith (Datum?) fand ein Weibchen von *N. carolinensis* in Columbus, Miss. (M. R. Smith 1942, p. 566)
- M. R. Smith (Datum?) fand ein Weibchen von *N. carolinensis* in Jacksonville, N. C. (M. R. Smith 1942, p. 566)
- H. Rueckes (Datum?) fand ein Weibchen von *N. wheeleri* in Fort Worth, Texas. (M. R. Smith 1942, p. 563)