

Neivamyrmex pertyi (Shuckard) ♀ ♀ ♂

(Taf. 26 Fig. 1; Taf. 35 Fig. 1-2; Taf. 44 Fig. 5-7, 10, 14, 19; Taf. 66 Fig. 3; Taf. 83 Fig. 2; Taf. 87 Fig. 1-2)

- Labidus pertii* Shuckard, 1840 p. 262 (Maennchen; nov. nom. pro *Labidus latreillii* Perty, 1833; nec Jurine, 1807). — Westwood 1842 p. 78. — Fr. Smith 1859 p. 7. *Ecton (Acamatus) pertyi*, Emery 1900a p. 517; 1910 p. 27. — Forel 1911b p. 250. — Bruch 1914 p. 214 (Buenos Aires; Bahia Blanca). — Gallardo 1920 p. 377 [nec fig. 29 = *jerrmanni* For.]. — Borgmeier 1923 p. 47. *Neivamyrmex pertii*, Borgmeier 1953 p. 12, 15. *Labidus latreillii* Perty, 1833 p. 138, pl. 27, fig. 11 [nec Jurine, 1807]. *Labidus illigeri* Shuckard, 1840 p. 397 (Maennchen; Brasil; Swainson leg.). — Westwood 1842 p. 76. — Fr. Smith 1859 p. 7, pl. 2 fig. 3. *Ecton (Acamatus) illigeri*, Emery 1900a p. 515; 1910 p. 26 (Minas Gerais). — Santschi 1912 p. 526 (Santiago del Estero). — Bruch 1915 p. 528 (Santiago del Estero). — Gallardo 1920 p. 375. — Borgmeier 1923 p. 46. *Ecton (Neivamyrmex) illigeri*, Borgmeier 1948c p. 462 (Tucumán). *Neivamyrmex illigeri*, Borgmeier 1953 p. 15. *Labidus fonscolombii* Westwood, 1842 p. 76 (Maennchen; "Brazil", Miers leg.). [n. o. v. s. y. n.] *Ecton (Acamatus) fonscolombii*, Emery 1910 p. 25 [nec 1900]. — Forel 1907 p. 2 (Santiago, Chile). *Neivamyrmex pertii fonscolombii*, Borgmeier 1953 p. 11-12, 18. *Labidus strobelii* Mayr, 1868 p. 166 (Maennchen; San Luis, Mendoza, Buenos Aires). *Ecton strobelii*, Berg 1890 p. 16. *Ecton (Acamatus) strobelii*, Emery 1900a p. 515, fig. 12; 1910 p. 27. — Bruch 1914 p. 215; 1916 p. 294, pl. 8 fig. 1-2 (Arbeiter, Maennchen); 1921 p. 175, fig. 1-2, pl. 1 fig. 1-5 (Arbeiter, Maennchen, Weibchen). — Gallardo 1915 p. 6; 1920 p. 351, fig. 19-20 (Arbeiter, Maennchen). — Santschi 1912 p. 525; 1916 p. 370. — Borgmeier 1923 p. 49. *Ecton (Neivamyrmex) strobelii*, Borgmeier 1948c p. 462 (Buenos Aires; Tucumán); 1949b p. 202 (Bahia). *Ecton nitens* Mayr, 1868 p. 168 (Arbeiter; Buenos Aires); 1886 (part.) p. 121 (Argentinien; nec Neugranada). — Berg 1890 p. 18. *Ecton (Acamatus) nitens*, Emery 1894a p. 184; 1900a p. 522; 1910 p. 24. — Santschi 1912 p. 525. — Bruch 1914 p. 215. — Mann 1916 p. 422 (Arbeiter; Paraíba: Independência).

Holotype: Maennchen, ohne Hinterleib (Mus. Genf). Die Type traegt folgende Zettel: 1) "Java" (durchgestrichen) "Brésil" (mit Bleistift); 2) E. Perty Shuck. (Forel's Handschrift); 3) L. Fonscolombei Westw.; 4) E. Perty Shuck. = Fonscolombei (Forel's Handschrift). Ich habe keinen Zweifel, dass es die eine der beiden Typen (ohne Hinterleib) ist, die Forel (1911b p. 250) erwähnt. Forel sagt, dass die Typen als "Labidus latreillei Jurine" bezeichnet waren; vielleicht war diese Bezeichnung auf einem getrennten Zettel im Kasten angebracht. Die andere von Forel erwähnte Type war im Muenchener Museum nicht mehr aufzufinden; sie ist nach Mitteilung von Dr. Förster wahrscheinlich im Kriege vernichtet. — Perty (1833) gibt als Fundorte an: "Habitat in Provincia Piauhensi et in Brasilia australi". Ich wähle "Piauí" als Typenlokalität.

Arbeiter. — *Maior*: Laenge mit gesenktem Kopf 5 mm, ausgestreckt 6-7 mm. Kopf ohne Mandibeln fast so breit wie lang (Laenge 1,68 mm, Breite 1,6 mm), vorn breiter als hinten, Seiten sanft konvex, Occipitalecken spitz ausgezogen (unter sich