

Neivamyrmex pseudops (Forel) ♂ ♀ ♂

(Taf. 24 Fig. 4, 4a; Taf. 34 Fig. 7; Taf. 36 Fig. 2; Taf. 45 Fig. 5-6, 12, 19, 23; Taf. 67 Fig. 2)

Eciton pseudops Forel, 1909 p. 254 (Arbeiter; San Bernardino, Paraguay).
Eciton (Acamatus) pseudops, Emery 1910 p. 25. — Werringloer 1932 p. 477, 499, Fig. 27, 35 (Augen). — Weiler 1936 p. 16 (Fuehler). — Borgmeier 1936 p. 64 (Arbeiter, Weibchen; Campinas, Goiás); 1939a p. 408, fig. 3 (Maennchen; Campinas, Goiás).
Neivamyrmex pseudops, Borgmeier 1953 p. 9.
Eciton (Acamatus) pseudops subsp. *garbei* Forel, 1912 p. 47 (Arbeiter; Franca, S. Paulo). — Bruch 1915 p. 528 (Arbeiter; Salta, Arg.). — Luederwaldt 1920b p. 244 (Franca, S. Paulo; Pirapora, Minas). — Gallardo 1920 p. 362 (Jujuy; S. Paulo). — Borgmeier 1923 p. 48; 1936 p. 64 (Arbeiter, Weibchen; Campinas, Goiás).
Eciton (Acamatus) pseudops subsp. *grandipseudops* Forel, 1915 p. 353 (Arbeiter; "Argentine"). — Bruch 1915 p. 528 (Salta). — Gallardo 1920 p. 364, fig. 23 (Salta; Córdoba).
Eciton (Acamatus) pseudops var. *grandipseudops*, Bruch 1928 p. 352, fig., pl. 6 fig. 1-2 (Arbeiter, Weibchen; Córdoba).

Typen: Arbeiter (Coll. Forel, Mus. Genf) von San Bernardino, Paraguay, Fiebrig leg. Cotypen in Coll. Borgmeier, Santschi (Mus. Basel), Wheeler (Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass.).

Arbeiter. — *Maior*: Laenge 7 mm. Kopf (Taf. 24 Fig. 4), Laenge 1,56 mm, vordere Breite 1,48 mm, hinten verschmaelert, Hinterecken breit abgerundet, Occipitalecken nicht ausgezogen. Augen rundlich, konvex. Mandibeln stark nach unten gebogen, Laenge 1 mm, Basalzahn fehlt, Basalrand in konvexem Bogen in den Kaurand uebergehend, Kaurand mit einigen rudimentaeren stumpfen Zaehnchen, Apikalzahn wenig gespitzt. Clypeus mit konvexem membranoesen Vorderrand. Stirnleisten ohne Zahn. Scapus lang (1,6 mm), den Hinterrand des Kopfes ueberragend; Geissel schlank, Laenge 3 mm, alle Glieder deutlich laenger als breit, zweites Glied laenger als das dritte, Glied 2-5 allmaehlich etwas verlaengert, 6-10 gleichlang, Endglied etwas kuerzer als die beiden vorhergehenden zusammen. Thorax (Taf. 24 Fig. 4a) schlank, Laenge 2,4 mm, Breite 1 mm. Pronotum vorn mit Querkiel. Promesonotum schwach gerandet, Breite dorsal 0,6 mm. Hoecker des Mesonotums maessig gross, im Profil hinten schraeg abfallend. Basalflaeche des Epinotums viel laenger als die absteigende Flaeche. Epipleuren ueber der Metasternaldruese eifoermig geschwollen. Petiolus: Laenge 0,6 mm, Breite 0,4 mm, Hoehe 0,5 mm; anteroventraler Zahn fehlend. Postpetiolus: Laenge 0,44 mm, Breite 0,56 mm. Gaster: Laenge 2 mm, Breite 1,48 mm. Beine schlank, Hinterschenkel 2,7 mm,