

indietro e, prima della loro estremità posteriore, formano un tuberculo sporgente. Le mandibole sono strette, fortemente curve e quasi piegate presso la base, poi, per un tratto, quasi dritte e ancora leggermente curve nel terzo apicale. Lo scapo delle antenne non è ingrossato e supera notevolmente il vertice, il flagello è lungo e gracile. Il torace è mediocremente gibboso in avanti i ricopre circa metà del capo, lo scutello è molto elevato, con breve impressione longitudinale all'estremo posteriore, l'epinoto è verticale, con grosso cercine alla base. Il peziolo è molto corto, ritondato lateralmente, incavato ad arco assai largo posteriormente. Il segmento seguente (2°) è molto più breve del terzo. Le zampe sono sottili, non molto corte. Ali brune con vene ferruginee; il nervo ricorrente incontra la 2^a cellula cubitale verso il terzo basale, e dopo l'incontro, la vena cubitale è assai poco ispessita. L. 15 mm.; Ala ant. 12 mm. — Amazonas, Manicoré, un esemplare".

Neivamyrmex scutellaris Borgmeier ♂

(Taf. 36 Fig. 8; Taf. 45 Fig. 8, 14, 25; Taf. 67 Fig. 5)

Neivamyrmex scutellaris Borgmeier, 1953 p. 28, fig. 6 (Maennchen; Panama, Cabima; Barro Colorado Is., C. Z.).

T y p e n : Maennchen; Holotype (USNM) und 1 Paratype (CTB) von Cabima, Panama, A. Busck leg. 21. und 26.V.1911; 1 Paratype (Coll. Schneirla) von Barro Colorado Island, C. Z., Schneirla leg. 28.V.46.

M a e n n c h e n . — Zur Originalbeschreibung ist folgendes hinzuzufügen: Faerbung roetlich-braun. Laenge 14-14,5 mm. Kopf (Taf. 36 Fig. 8): Breite 2,24 mm, Hoehe 1,28 mm, Stirnbreite 1,2 mm. Augen stark konvex, Laenge 0,88 mm. Breite des vorderen Ocellus 0,36 mm, Abstand der hinteren Ocellen unter sich 0,52 mm, Abstand vom Auge 0,16 mm, Abstand vom vorderen Ocellus 0,12 mm. Mandibeln etwas abgeflacht, Laenge 1,4 mm. Scapus 1,08 mm; Geissel 4,4 mm, zum Apex etwas verduennt, Glied 1 kurz, etwas mehr als 1/2 des zweiten, 2 kuerzer als 3, Glied 3-11 ungefaehr gleichlang. Thoraxbreite 2,4 mm, Laenge dorsal bis zum Apex des Scutellums 4,4 mm, Laenge des Scutellums in der Mitte 1,2 mm. Petiolus von den Fluegeln bedeckt, Breite nicht messbar. Hinterschenkel 2,4 mm, Breite 0,48 mm; Hintertibiae 2 mm. Tarsen duenn, Hintertarsus 2,8 mm. Krallen nicht gezaehnt. Genitalien s. Taf. 45. Fluegel (Taf. 67 Fig. 5) ziemlich breit; Laenge 12 mm, Breite 4,2 mm.