

Ventralkanten der Schenkel und Schienen (besonders der Hinterschienen) laenger behaart. Faerbung braun, Stirn geschwaerzt, Mandibeln und Scapus hellbraun. Fluegel rostgelb.

Arbeiter und Weibchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Bolivien.

Untersuchtes Material. — 1 Maennchen (Holo-type) von Bolivien, Staudinger leg.

Diskussion. — *N. lepiognathus* steht *physognathus* Em. aeusserst nahe, unterscheidet sich aber leicht durch die anders geformten und etwas abgeflachten Mandibeln. Emery's Fig. 15 ist ungenau, die Anschwellung ist nicht eckig. Das Fluegelgeaeder weist ebenfalls einige Verschiedenheiten auf.

Originalbeschreibung

Eciton (Acamatus) leptognathum Emery (1900). — "Maschio. Colore, pubescenza e forma del capo e del torace come nella specie precedente [*maxillosum*], ma più piccolo. Le mandibole sono quasi dritte nella loro metà basale, più fortemente curve nella metà distale, molto strette, il loro margine mediale offre, non lungi dalla base, un angolo sporgente o dente estremamente ottuso. Le antenne sono un poco meno lunghe, il pezio meno breve, le ali più chiare; del resto come *E. maxillosum*. L. 13 mm., Ala ant. 12 mm. — Bolivia (Staudinger) un esemplare..."