

concavo verso la punta; lo scapo è alquanto più corto e più grosso; le ali sono più scure, con venatura nerastra. Del resto simile a *E. maxillosum*. L. 15 mm.; Ala ant. 14½ mm. — Bolivia (Staudinger) un esemplare. — Le tre specie [*maxillosum*, *leptognathum*, *falciferum*] hanno in comune lo scapo oltrepassante notevolmente il vertice e il 2º segmento addominale molto più breve dei seguenti. Differiscono principalmente per la forma delle mandibole. Sono nel dubbio se siano veramente specie distinte o varietà della medesima specie. Il numero degli esemplari osservati è insufficiente per stabilire un giudizio".

*Eciton (Acamatus) leptognathum* var. *mesognathum* Santschi (1920). — "Mâle. Long. 12-13 mm.; largeur de la tête 2,2, du thorax 2,6, du gastre 2,5 mm.; longueur de l'aile 12 mm. Diffère du type de l'espèce en ce que la dent du bord interne des mandibules est remplacée par une légère saillie arrondie sans avoir cependant l'extension basale de la var. *physiognathum* [sic!] Em. Elles sont moins pliées à la base que chez *E. maxillosum* Em. mais un peu plus que chez *leptognathum*, le bord externe est aussi droit que chez *maxillosum*. Couleur, sculpture, forme de la tête, thorax comme chez *maxillosum*, mais sans impression sur le scutellum. Fait transition entre *maxillosum* et *leptognathum*. — Guyane française: St. Laurent du Maroni (Le Moult) 2 mâles".