

Neivamyrmex pilosus (Fr. Smith) ♀ ♀ ♂

(*N. pilosus* s. str.: Taf. 23 Fig. 1, a-c; Taf. 39 Fig. 4; Taf. 46 Fig. 13; Taf. 68 Fig. 3. — *N. pilosus beebei*: Taf. 43 Fig. 1-2, 5-6. — *N. pilosus mexicanus*: Taf. 34 Fig. 5; Taf. 39 Fig. 2; Taf. 46 Fig. 2, 6, 8, 10-11, 18; Taf. 68 Fig. 1. — *N. pilosus mandibularis*: Taf. 39 Fig. 5; Taf. 46 Fig. 3, 7, 12; Taf. 68 Fig. 2. — *N. pilosus* subsp. [Bolivia]: Taf. 39 Fig. 3; Taf. 43 Fig. 14; Taf. 46 Fig. 9; Taf. 68 Fig. 4)

***N. pilosus* s. str. et lato:**

Ecton pilosa F. Smith, 1858 p. 151 (Arbeiter; Villa Nova am Amazonas).
Ecton pilosum, Mayr 1865 p. 77; 1886 p. 120. — Dalla Torre 1893 p. 5.
Ecton (Acamatus) pilosum, Emery 1894a p. 183 (im Schluessel); 1900a p. 524; 1910 p. 25. — Luederwaldt 1918 p. 27; 1920b p. 246; 1926 p. 247 (Franca, S. Paulo). — Borgmeier 1923 p. 48; 1934 p. 94. — Eidmann 1936 p. 32 (Biol.). — G. C. Wheeler 1943 p. 331, pl. 2 fig. 34-36 (Larve; Paraguay).
Ecton (Acamatus) pilosum v. *angustius* Forel, 1909 p. 256 (San Bernardino, Paraguay). — Emery 1910 p. 25. — Wheeler 1921 p. 312.
Ecton (Acamatus) porrectognathum Borgmeier, 1933b p. 167 (Maennchen; Angra dos Reis u. Itatiaia, Rio de Janeiro). [nov. syn.]
Neivamyrmex pilosus porrectognathus, Borgmeier 1953 p. 5.

***N. pilosus beebei*:**

Ecton (Acamatus) pilosum v. *beebei* Wheeler, 1921 p. 312, fig. 7b (Arbeiter, Maennchen; Kartabo, Brit. Guiana).
Neivamyrmex pilosus beebei, Borgmeier 1953 p. 19.

***N. pilosus mexicanus*:**

Labidus mexicanus F. Smith, 1859 p. 7 (Maennchen; Orizaba, Mex.). — Cresson 1872 p. 194.
Ecton mexicanum, Dalla Torre 1893 p. 4. — Forel 1899 p. 27.
Ecton (Labidus) mexicanum, Emery 1895b p. 260 (Texas); 1896a p. 33 (Alajuela, Costa Rica).
Ecton (Acamatus) mexicanum, Emery 1900a p. 515, 525, fig. 19; 1910 p. 26. — Wheeler 1908a p. 414, pl. 26 fig. 11. — M. R. Smith 1931b p. 295-297.
Ecton (Acamatus) pilosum v. *mexicanum*, Borgmeier 1936 p. 59; 1939a p. 416 (Costa Rica).
Ecton pilosum, Forel 1899a p. 27 (Arbeiter). — Wheeler & Long 1901 p. 165.
Ecton (Acamatus) pilosum, Wheeler 1908b p. 412 (Arbeiter, Texas); 1921 p. 313 [nec fig. 7a = *pilosus mandibularis*]. — M. R. Smith 1924 p. 85 (Biol.); 1931b p. 295. — Reichensperger 1939b p. 297 (Weibchen; Costa Rica).
Ecton (Neivamyrmex) pilosum, M. R. Smith 1942 p. 544, fig. 2, 7, 13 (Arbeiter, Maennchen; 1951 in Muesebeck, p. 781. — Creighton 1950 p. 75.
Neivamyrmex pilosus mexicanus, Borgmeier 1953 p. 17.
Ecton clavicornis Norton, 1868c p. 46 (Arbeiter; Hacienda Potrero, Mex.).
Ecton (Labidus) subsulcatum Mayr, 1887a p. 440 (Maennchen; Texas, Mex.).
Labidus subsulcatum, Cresson 1887 p. 259.
Ecton aztecum Forel, 1901a p. 49 (Maennchen; Guatemala).
Ecton (Acamatus) mexicanum v. *azteca*, Emery 1910 p. 26.
Ecton (Acamatus) pilosum v. *aztecum*, Wheeler 1921 p. 314.
Ecton (Labidus) spininode subsp. *militarium* Santschi, 1929a p. 85 (Arbeiter; Panama, Changuinola). — Borgmeier 1953 p. 14.

***N. pilosus mandibularis*:**

Ecton (Neivamyrmex) pilosum subsp. *mandibulare* M. R. Smith, 1942 p. 548, pl. 3 fig. 14 (Maennchen; "near Quijotoa, Pima Cou., Arizona"); 1951 in Muesebeck, p. 781. — Creighton 1950 p. 76.
Ecton (Acamatus) pilosum, Wheeler 1921 part. [p. 314] (Maennchen, Nogales, Ariz.).

Holotype: Arbeiter (Brit. Mus. N. H., London) von "Villa Nova" [am Amazonas], Bates leg. — Bei meinem zweimaligen Besuch in London (1932, 1951) habe ich die Type von *pilosus* nicht gefunden. Ich sah nur zwei Arbeiter von *pilosus*, die zwar als "Typen" bezeichnet waren, aber mit einem