

the typical *pilosum*. Wings less yellowish, slightly infuscated, with brown instead of resin yellow vein. — I regard as typical *pilosum* males several specimens in my collection from Frontera, Tabasco, Mexico; Nogales, Arizona (Osiar), Texas (Belfrage), Wharton, Texas (Cornell Univ.) and Austin, Texas (Wheeler)".

*Eciton (Labidus) spininode* subsp. *militarium* Santschi (1929). — "Ouvrière. Long: 3,5 à 3,9 mm, taille probablement moyenne. D'un brun rouge foncé. Tête plus obscure devant. Gaster noir. Epistome jaunâtre. Mandibules, funicule, tibias et tarses d'un brun plus clair. Luisante. Col du pronotum, échancrure mésépinotale, mésépisternum et metasternum, articulations du pétiole réticulés ponctués ou finement rugueux. Le reste lisse avec des points épars. Pilosité dressée, fine, claire, assez abondante et longue sur le corps, plus courte sur les appendices. Pas de pubescence couchée. — Tête environ 1/4 à 1/5 plus longue que large, à peine plus étroite derrière que devant, les côtés modérément convexes. Yeux ocelliformes assez grands, au tiers postérieur de la tête. Crêtes frontales arquées, séparées, terminées derrière par un lobe triangulaire aigu. La crête externe des fosses antennaires à peine arquée. Mandibules finement striées, à bord terminal dentées, plus long que l'interne, l'externe concave. Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête. Tous les articles du funicule plus longs qu'épais et de plus en plus longs et larges. Le promésotonum dessine un profil régulièrement et longuement arqué, lentement abaissé vers la stricture métanotale. Celle-ci pas profonde. Face basale de l'épinotum faiblement convexe, d'un tiers plus long que la déclive et à laquelle elle passe par un angle très arrondi. Pétiole 1/2 à 1/3 plus long que large, convexe dessus, le dessous armé d'une épine recourbée en arrière et placée tout en avant contre l'articulation (plus en arrière chez *E. spininode* Em.) et en arrière de laquelle le bord inférieur est rectiligne. Postpétiole un quart plus long que le pétiole, aussi large derrière que long, rétréci devant, arrondi dessus, le dessous convexe et tuberculé devant. — Voisin de *E. spininode* Em., mais celui-ci est mat, bien pubescent, l'avant dernier article antennaire plus court, l'épinotum plus long et plus droit. — Panama: Changuinola, District Bocas del Toro, 3.VII.1914 (G. C. Wheeler) 3 ouvrières".

*Eciton (Acamatus) porrectognathum* Borgmeier (1933). — "Esta espécie é afim de *E. spinolae* (Westwood), mas difere pela formação das mandíbulas, pecíolo muito menos comprido, etc. — Macho. Comprimento: 12 mm. Cabeça pequena. Fronte muito mais larga que comprida. Lâminas frontais aguçadas, convergindo um pouco para trás e terminando a alguma distância do ocelo anterior por um dentículo pequeno. Entre as lâminas frontais há um profundo sulco longitudinal. Os ocelos laterais distam da margem ocular mais ou menos pelo seu diâmetro. Mandíbulas estreitas, um pouco menos compridas que o bordo anterior do clipeo, ligeiramente dilatadas no segundo terço, bordo lateral (visto pelo dorso) reto, sómente o ápice curvado para dentro, bordo interno bisinuoso; visto de perfil, a metade apical é ligeiramente curvada para diante. Escapo cilindriforme, ultrapassando um pouco o ocelo lateral; funículo delgado, artigo terminal um pouco menos comprido que os dois antecedentes adicionados. Tórax muito abaulado. Escutelo atrás, com ligeira impressão mediana. Pecíolo menos comprido que em *spinolae*, duas vezes tão comprido que largo, anteriormente escavado, em cima ligeiramente convexo em sentido longitudinal e transversal; ângulos posteriores não protraídos. Asa fortemente enfu-