

finer pilosity, and paler wings. Wheeler (1908) mentions having examined specimens of *mexicanum* collected July 18 by Oslar at Nogales, Ariz. I have not seen the specimens, but they may belong to this subspecies. — The difference between *mandibulare* and the typical *pilosum* are clearly stated above. As the shape of the mandible of this new subspecies is one of the easiest and best characters for distinguishing it, I have emphasized this fact by calling the new form *mandibulare*. Males have been collected from early July to late August".

### *Neivamyrmex impudens* (Mann) ♂

(Taf. 23 Fig. 2, a-b)

*Ecton (Acamatus) impudens* Mann, 1922 p. 19, fig. 9 (Arbeiter; Progresso, Honduras).  
*Neivamyrmex impudens*, Borgmeier 1953 p. 10.

**T y p e n :** Arbeiter (USNM, MCZ, Coll. Borgmeier und Mus. Genua), von Progresso, Honduras, W. M. Mann leg.

**A r b e i t e r .** — Die Originalbeschreibung ist ausgezeichnet; es genügt, folgendes hinzuzufügen. *Maior* (Cotype): Laenge 6,5 mm. Kopf (Taf. 23 Fig. 2) fast so breit wie lang; Breite 1,44 mm, Hoehe 1,52 mm. Augen konvex und relativ gross, ueber der Kopfmitte gelegen. Mandibeln 0,8 mm. Stirnleisten ohne Zahn, vor den Fuehlergruben eine schmale Lamelle bildend. Mittelfurche kurz, aber deutlich. Scapus 1 mm, basal weniger verduennt als bei *pilosus*. Geissel 2,2 mm, 2. Glied sehr wenig laenger als das dritte, Glied 3-10 allmaehlich etwas verkuerzt und verbreitert. Thorax (Taf. 23 Fig. 2a) 2,2 mm, Breite 0,8 mm, hinter dem Mesonotum etwas eingeschnuert. Pronotum vorn mit Querkiel. Epinotum hinten etwas seitlich zusammengedrueckt, Basalflaeche abgeflacht, Metasternaldruese eifoermig geschwollen. Petiolus: Laenge 0,6 mm, Breite 0,36 mm, Hoehe 0,48 mm; anterolaterale Zaehne gut entwickelt; anteroventraler Zahn kurz, spitz. Postpetiolus: Laenge 0,48 mm, Breite 0,44 mm. Gaster 1,8 mm. Hinterschenkel 2 mm, Hintertibiae 1,8 mm, Hintertarsus 2,5 mm (Metatarsus 1,2 mm). — Kopf, Postpetiolus, Gaster und Beine stark glaenzend. Thorax und Petiolus dicht und fein punktiert, matt; Seiten des Pronotums und des Petiolus etwas glaenzend. Behaarung zerstreut, maessig lang, am Gaster reichlicher; Scapus abstehend, Beine schraeg behaart. Faerbung