

sides. Postpetiole from above distinctly broader than petiole and broader than long, anteriorly narrowed, anterior and posterior margins transverse, sides convex. — Head, postpetiole, and gaster of maxima worker shining, with deep, setigerous punctations. Thorax and postpetiole similarly punctate with the addition of fine reticulations rendering the surface sub-opaque. Minima worker entirely shining with coarse, setigerous punctations. Mandibles coarsely punctate-striate. Pilosity of fine, suberect, long, and moderately abundant hairs. Color yellowish brown, darker in the maxima worker. Pilosity golden yellow. Described from a score of workers taken by myself Nov. 24, 1934, under a log on grassy, sandy ground close to the sea at Mayaro Bay, Trinidad, B.W.I. (*cotypes*), and from a few worker heads taken from the stomach of a *Bufo marinus* March 22, 1935, between 8:30 and 9:15 P. M., St. Augustin, Trinidad (*metatypes*). — This species appears close to *Acamatus punctaticeps* Emery, comparing with the original description, but differs in smaller size, mandibular dentation, and in antennal scape".

Neivamyrmex antillanus (Forel) ♀

(Taf. 25 Fig. 2, a-b)

Eciton antillanum Forel, 1897, p. 299 (Arbeiter; Grenada, B. W. I.).
Eciton (Acamatus) antillarum [sic], Emery 1910 p. 24.
? *Eciton klugi*, Forel 1897 p. 299 [nec Shuckard].
Neivamyrmex antillanus, Borgmeier 1953 p. 9.

T y p e n : Holotype (Brit. Museum), 2 Cotypen (Mus. Genf), 1 Cotype (CTB); von der Insel Grenada, B.W.I., H. H. Smith leg.

A r b e i t e r . — *Maior* (Cotype): Laenge mit gesenktem Kopf 5,5 mm. Kopf (Taf. 25 Fig. 2) eine Spur hoher als breit; Hoehe 1,72 mm, Breite 1,6 mm. Augen vorhanden, ein kleiner gelber Fleck in der Epidermis, etwas ueber der Kopfmitte. Mandibeln 1 mm, Breite 0,4 mm. Scapus 0,76 mm, nicht staerker verdickt als bei *spinolai*. Geissel 1,48 mm, etwas duenner und schlanker als bei *spinolai*, Glied 1-2 deutlich laenger als breit (auch bei *spinolai*, aber weniger auffallend), 3-6 sehr wenig laenger als breit, 7-8 fast quer. Thorax (Taf. 25 Fig. 2a): Laenge 1,88 mm, Breite 0,92 mm. Pronotum vorn ohne Querkiel. Promesonotum fast dreimal so lang wie die Basalflaeche des Epinotums (28:10). Epinotum im Profil deutlich tiefer liegend als bei *spinolai*; Breite des Epinotums 0,48 mm. Petiolus (Taf. 25 Fig. 2a-b): Laenge 0,44 mm, Breite 0,40 mm, Hoehe 0,48 mm, dorsal im Profil konvex, ventral vorn ohne Zahn oder