

Stirn, Mesonotum und Scutellum meist dunkelbraun oder schwarzbraun. Fluegel grau, Adern gelbbraun, Stigma schwarz.

Arbeiter und Weibchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Mexico; U.S.A. (New Mexico, Arizona).

Untersuchtes Material. — 46 Maennchen. Mexico: [Typen; Mus. Genua; Mus. Paris]; Vera Cruz, Tampico [VIII. 1911]; Colima, Vulcano [L. Conradt]. U.S.A., Arizona: Sabino Basin, S. Catalina Mts. 3800 ft [Share with Clark and A.N.S.P., 8.-20.VII.1916]; Stratton, S. Rita Mts. 6-7000 ft [Wheeler, 27.VII.17]; Cochine Co. [Beamer 20.VII.27]. New Mexico: Deming [Wheeler].

Diskussion. — *N. andrei* wurde dem franzoesischen Entomologen Ernest André (gest. 1914) gewidmet. Die systematische Stellung dieser Art ist zweifelhaft. Ich habe sie in dieser Gruppe untergebracht, weil sie im Habitus eine gewisse Aehnlichkeit mit *detectus* zeigt. Sie ist aber grundverschieden durch die Bildung der Mandibeln, die konvexe Schwellung des Occiputs hinter den Augen, und besonders durch die Genitalien. Den Stipes kann man sich von *longiscapus* abgeleitet denken, aber das beruht wahrscheinlich auf Konvergenz, denn die uebrigen Charaktere zeigen keine Beziehungen zur *pilosus*-Gruppe.

Synonymie. — Die Holotype von *ostlari* Wheel. (von Nogales, Ariz., 15.VII.1903) soll nach Creighton im American Museum von New York sein. Ich habe die Type nicht gesehen, aber die Beschreibung laesst keinerlei Zweifel, dass *ostlari* ein Synonym von *andrei* ist. Ich habe den Namen schon in einer frueheren Arbeit (1953) eingezogen.

#### Originalbeschreibungen

*Eciton andrei* Emery (1901). — "Maschio. Rosso ferrugineo chiaro, parte posteriore del capo e dorso del torace bruno scuro; lucido, con pubescenza copiosa, più longa e obliquamente staccata sulle zampe; capo, davanti del torace, scutello, peziolo e faccia inferiore dell'addome con peli più lunghi. Capo trasversalmente ovale, occipite alquanto convesso, occhi ed ocelli grandi, questi egualmente distanti l'uno dall'altro e dagli occhi composti, distanza minore del diametro di un ocello. Clipeo senza denti; mandibole uniformemente e debolmente curve, poco più brevi del margine del clipeo. Lamine frontali fortemente sporgenti, divergenti indietro, prolungate con largo cercine quasi fino agli occhi. Torace mediocrement sporgente innanzi; scutello senza solco, epinoto quasi verticale. Peziolo largo quanto il gastro, subrettangolare, depresso superiormente, con angoli smussati, specialmente gli anteriori. Segmenti del gastro separati l'uno dall'altro per strozzamenti distinti; pigidio compresso e fesso posteriormente, ipopigio viloso. Lamina subgenitale profondamente incisa ad arco, con piccolo dente mediano, nel fondo dell'incisura. Zampe come nell'*E. Harrisii*, meno corte e meno gracili che nell'*E. Walkeri*; il 1º articolo del tarso medio lungo circa