

kuerzer, besonders auf der abschuessigen Flaechen des Epinotums. Petiolus auf der Ventralseite mit ziemlich dichten, abstehenden Haaren. Gaster mit sehr kurzer, anliegender, seidenschimmernder Pubescenz. Beine mit dichter, schraeger, kurzer Behaarung. Faerbung schwarz bis schwarzbraun, Gaster lebhaft roetlichbraun. Schaft schwarz, Geissel dunkelbraun. Beine schwaerzlich, aber distales Ende der Tibien und Tarsen roetlich. — Holotype im Museu Paulista (Nr. 19687), Luederwaldt leg. V.1916, Ypiranga (S. Paulo), des Morgens am Wege. — Anmerkung: Die neue Art steht *E. spegazzinii* Em. am naechsten, wovon ich ein Maennchen aus La Plata (ex coll. Wasmann) besitze, ist aber deutlich kleiner und durch die Bildung des Petiolus und weniger reichliche Behaarung leicht zu unterscheiden".

### *Neivamyrmex raptans* (Forel) ♂ ♀ ♂

(Taf. 29 Fig. 1-21; Taf. 34 Fig. 17-18; Taf. 38 Fig. 5; Taf. 48 Fig. 5, 7, 21; Taf. 71 Fig. 3; Taf. 86 Fig. 1, 3)

- Eciton (Acamatus) raptor* Forel 1911a p. 289 (Arbeiter; Ipiranga, S. Paulo) [nec F. Smith 1855 p. 14, pl. 13 fig. 3-4].  
*Eciton (Acamatus) raptans* Forel, 1911c p. 395, nota 1 (nov. nom.). — Luederwaldt 1920b p. 249 (Ipiranga, S. Paulo); 1926 p. 250 (Biol.). — Bruch 1925 p. 125 (Córdoba). — Santschi 1934 p. 25, pl. 3 fig. 3, 7-8, 12-13 (Cotyphen, Arbeiter).  
*Neivamyrmex raptans*, Borgmeier 1933 p. 8.  
*Eciton (Acamatus) hetschkoi* v. *raptans*, Bruch 1928 p. 350 (Gaeste).  
*Eciton (Acamatus) raptans* v. *rebellatum* Santschi, 1934 p. 25, pl. 3 fig. 4, 6, 10, 14, 19 (Arbeiter, Maennchen, Weibchen; Córdoba und Santa Fé). — Bruch 1934 p. 127, fig. 4 (9), 6 (8, 8a), pl. 3 das Weibchen links, ohne die Arbeiter [n. v. syn.].  
*Eciton (Acamatus) abstinens* v. Ihering, 1912 p. 232 (sine descr.).  
*Eciton (Acamatus) hetschkoi*, Santschi 1920 p. 369 (Maennchen; Santiago del Estero) [nec Mayr]; 1921 p. 92 (Maennchen; Santiago del Estero, Wagner leg. IV.-VI., XII.). — Bruch 1924 p. 232, fig. 1-7, pl. 1-2 (Maennchen, Weibchen, Arbeiter; Alta Gracia, Fives Lille).  
*Eciton (Acamatus) hetschkoi* v. *oglobini*, Bruch 1934 fig. 4 (9) p. 127 [die ausgezogene Fig. 9 bezieht sich auf das Weibchen von Fives Lille]. — Borgmeier 1936 p. 63 (Maennchen; Alta Gracia).

Cotyphen: Arbeiter (Mus. Genf, Nr. 10.031), von Ipiranga, S. Paulo. Nidotypen im Departamento de Zoologia, S. Paulo (Nr. 10.031) und CTB (Nr. 1890).

Arbeiter. — *Maior* [Exemplar von Ipiranga, CTB Nr. 2440]: Laenge 4 mm. Kopf (Taf. 29 Fig. 1, 3): Breite 1,04 mm, Hoehe 1,08 mm, Seiten deutlich konvex. Augen rudimentaer, etwas ueber der Mitte. Mandibel (Taf. 29 Fig. 2) 0,6 mm, Basalzahn vorhanden, Basalrand konkav, Kaurand mit einem Zahn ungefaehr auf der Mitte. Fuehlergruben vorn offen, ohne Lamelle. Scapus bis zum Augenniveau reichend, Laenge 0,6 mm. Geissel 1,48 mm lang, Glied 2 laenger als breit, Glied 3-10 so lang wie breit oder etwas laenger (Taf. 29 Fig. 15-21). Thorax: Laenge