

riamente, lados convexos, ângulos occipitais protraídos em ponta aguda. Olhos pequenos mais distintos. Escapo ultrapassando um pouco o nível dos olhos. Lâminas frontais curtas. Carenas laterais das foveas antennais presentes, brilhantes. Mandíbulas largas, bordo lateral ligeiramente côncavo, bordo apical com alguns denticulos obtusos. Tórax moderadamente robusto. Promesonoto anteriormente sem carena transversal. Constrição mesoepíctal profunda, também visível nos exemplares menores; epinoto situado num nível mais baixo do que o promesonoto; face basal distintamente mais comprida que a face declive. Pecíolo visto de perfil, tão alto como comprido, em cima convexo; face anterior submarginada e anteriormente de cada lado com um dente obtuso; espinho anteroventral distinto, agudo, dirigido para baixo; visto de cima, o pecíolo é mais comprido que largo, posteriormente mais largo que anteriormente. Póspecíolo visto de perfil, um pouco mais alto que comprido, em cima fortemente convexo, face ventral com um pequeno entalho atrás do meio; visto de cima, o póspecíolo é subtrapezoidal, com os ângulos anteriores arredondados. Unhas simples. — Cabeça, tórax, pecíolo e póspecíolo inteiramente mates, mui densamente pontuados à guisa de dedal. Mandíbulas finamente estrioladas, ponta apical brilhante. Abdomen brilhante, bem como as patas. Pêlos compridos, eretos, amarelo-esbranquiçados em todo o corpo, semieretos nas patas. Gastro e patas também com pêlos menores, subadjacentes. Coloração vermelhoparda; gaster e patas mais claros, amarelados. Localidade do tipo: Itatiaia (Estado do Rio de Janeiro), kilom. 1, J. F. Zikán leg. 17.III.1926. Tipo no Instituto de Biología Vegetal do Rio de Janeiro, sob o número 7576. Cotipos na minha coleção. A descrição se baseia sobre numerosos operários que foram amavelmente remetidos pelo Prof. A. Reichensperger. Em companhia desta formiga foram encontrados os exemplares de *Ecitomerus impressifrons* Borgm. (Staphyl.)".

### Neivamyrmex sp. b ♀

(Taf. 34 Fig. 2)

Weibchen (stenogastrisch). — Laenge 17 mm. Kopf deutlich länger als breit, Laenge 2,2 mm, Breite 1,8 mm, Seiten von oben parallel, Hinterecken abgerundet, Hinterrand gerade, Occiput in der Mitte mit ovalem Eindruck. Im Profil ist der Kopf vorn am dicksten und fast senkrecht abgestutzt, hinten fällt er in konvexer Kurve zum Occipitalrand ab. Augen sehr undeutlich, fast ausgelöscht. Mandibeln 0,92 mm, wenig gebogen, schmal, zum Apex verjüngt, apikal gespitzt, Innenrand basal etwas ausgebuchtet, dann schwach konvex. Clypeus jederseits flach ausgebuchtet, in der Mitte schwach konvex. Stirnleisten vorn sehr niedrig, kaum erkennbar, oben zwei starke abgerundete Wuelste ueber den Fuehlergruben bildend, die durch eine tiefe Furche getrennt sind; diese muendet hinter den Wuelsten in einer ovalen