

*opacithorax*. Thorax, in profile, approximately three and three-fourths times as long as high; mesonotum flattened; posterior part of epinotum convex, and slightly higher than any other part of thorax. Thoracic sutures absent dorsally. Petiole apparently as high as epinotum but not so long; according to Creighton (1932) "ventrally the petiole is constricted to form a very thick, short, posterior peduncle and a much longer subtriangular portion which extends forward under the node and is narrowed in front to form the anterior peduncle". Petiole subquadrate, very slightly longer than broad, with rounded anterior angles, subparallel sides, and a shallow, dorsal impression, which is broader posteriorly than anteriorly. Body and appendages shining except funiculi and tarsi. Head and thorax without the dense granulate shagreening between the numerous and distinct punctures. Head, thorax, petiole, and appendages covered for most part with moderately abundant hairs; longer and less numerous hairs on mandibles, clypeus, edges of petiole, and appendages. Rich reddish brown... Description of female drawn from that caste of Creighton's *dubia*".

Maennchen unbekannt. M. R. Smith (1942) vermutet, dass *harrisi* das Maennchen von *wheeleri* ist.

Geographische Verbreitung. — U.S.A. (Texas). Mexico (Jalisco).

Untersuchtes Material. — Arbeiter: U.S.A., Texas: Hays Co. [Wheeler; 3 Cotyphen in Coll. Forel]; Austin [Wheeler]; Hillsboro [Vanderford]; Corpus Christi [Chanoï]; Dallas [Jones]. — Mexico, Jalisco: Guadalajara [Wheeler] [Clendon].

Diskussion. — *N. wheeleri* unterscheidet sich von allen andern Arten dieser Gruppe durch die transparente Lamelle vor den Fuehlergruben. Der Thorax ist viel robuster und das Stielchen viel dicker als bei *nigrescens* und *opacithorax*; die Occipitalecken sind auch mehr ausgezogen, zahnfoermig. *N. wheeleri* kann mit *carolinensis* und *rugulosus* verwechselt werden, aber bei diesen beiden Arten sind die Fuehlergruben vorne offen, und die Geissel ist viel dicker. — Das Weibchen von *wheeleri* ist nach M. R. Smith charakterisiert durch die winkligen Occipitalecken, den laenglichen Thorax, das Fehlen der Suturen auf dem Thorax und den quadratischen Petiolus.

Variation. — Einige Arbeiter des mir vorliegenden Materials sind ganz gelbrot; sie sind sicher unausgefaerbt. Die Skulptur des Thorax ist etwas variabel; bei einigen Individuen ist der Thorax schwach glaenzend.