

Arbeiter und Weibchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Costa Rica,  
Panama.

Untersuchtes Material. — Costa Rica: Hamburg-farm, Prov. Santa Clara [Nevermann 25.XI.35; Cotypen] [Nevermann 28.X.37]; Iberia-Farm, S. Clara Prov. [Nevermann 28.I.27]; Parismina Branch, S. Clara [Nevermann 18.X.26]; Costa Rica [de Lafon 1884]. Panama: ?Bugaba ([Wm. Schaus]).

Diskussion. — *N. spatulatus* steht *diabolus* am naechsten, unterscheidet sich aber durch geringere Groesse, kleinere Ocellen, schmalere Mandibeln, grobe Punktierung der Stirn und Bildung der Genitalien.

#### Originalbeschreibung

*Eciton (Acamatus) spatulatum* Borgmeier (1939). — "Macho. Comprimento 11 mm. Fronte tão alta como larga, bordo anterior vermelho, com puncturas muito grossas, mate (ou submate). Carenas frontais ligeiramente convergentes para traz, aguçadas, curvadas para os lados mais ou menos no meio da fronte, e formando uma gibosidade acima das foveas antennais; inferiormente também recurvadas, mas não atingindo a margem anterior do clípeo que é reto. Olhos grandes, ocupando quase inteiramente os lados da cabeça, fortemente convexos. Ocelos grandes, os laterais muito aproximados do ocelo anterior e afastados da margem ocular por uma distância aproximadamente igual ao seu diâmetro. Escapo engrossado para o ápice, atingindo o centro do ocelo anterior, pardo-avermelhado; funículo vermelho. Mandíbulas fortemente curvadas no primeiro terço, dilatadas no terço distal mas attenuadas no ápice; brilhantes, pontuadas; metade basal preta, extremidade apical pardo-vermelha. Mesonoto não ultrapassando o pronoto, com sulco mediano distinto até o meio do dorso. Escutelo com uma impressão muito fraca. Pecíolo duas vezes mais largo que comprido; visto de cima, anteriormente ligeiramente côncavo, bordos laterais um pouco divergentes para traz; ângulos posteriores um pouco protraídos e arredondados. Póscpecíolo um pouco mais comprido do que o 2º tergito do gaster. Placa subgenital com um dente obtuso no meio da incisão. Asas enfaçadas, asa anterior 9 mm; o nervus recurrens alcança a segunda célula cubital antes do meio. Coloração preta, ápice das mandíbulas, bordo anterior da cabeça, face ventral do corpo e as patas de coloração pardo-avermelhada; funículo vermelho. Gaster com anéis vermelhos separando os segmentos. Fronte, dorso do tórax e escutelo com puncturas muito grossas e densamente agrupadas, quase mates; pleuras também fortemente pontuadas, ligeiramente brilhantes. Escapo quase mate, gaster brilhante. Há pêlos compridos no vértice, no clípeo e nas mandíbulas, menos compridas na fronte. Tórax com pubescência adjacente densamente agrupada, curta. Pecíolo e gaster com pubescência mais comprida; patas com pubescência obliqua. — Tipos 7 machos de Costa Rica, Hamburgfarm, F. Nevermann leg. 25.XI.1935, à luz (Reichensperger N° 13, 200). A espécie é próxima de *harrisi* Haldeman, 1852, mas as mandíbulas são diferentes; essas parecem ser semelhantes às de *diabolus* For. 1912".