

Diskussion. — *N. balzani* steht wegen der relativ kürzeren Fühler und des maßig schlanken Thorax *bohlisi* am nächsten, unterscheidet sich aber durch den glänzenden Petiolus (bei *bohlisi* matt) und den schmaleren Postpetiolus (bei *bohlisi* breiter als lang).

#### Originalbeschreibung

*Eciton (Acamatus) balzani* Emery (1894). — "Operaria. Fusca, mandibulis piceis, pedibus abdomineque cum pedunculo testaceis, nitida, pilosa, capite longiore quam latiore, postice angustiore et profunde arcuatim exciso, angulis posticis prominentibus, lateribus crebrius, medio parcus punctato, mandibulis angustis, nitidis, versus apicem striatulis, margine masticatorio cum dente medio minuto, et post ipsum denticulis obsoletis, oculis nullis, antennarum flagelli articulis basalibus vix laticribus quam longioribus; thorace elongato, sutura promesonotali obsoleta, pronoto antice acute marginato, superne convexo, metanoto dorso elongato, subrecto, paulo depresso, postice subgibboso, parte declivi brevi, marginata, prothorace et mesonoto nitidissimis, metanoto et mesopleuris punctato rugulosis, subopacis; abdomine nitido et disperse punctato, pedunculi nodis subaequalibus, subtus antice cum denticulo minuto, 1° paulo minus laevi, microscopice punctulato, unguiculis simplicibus. Long.  $2\frac{1}{3}$ -4 mm. Salinas sul Beni in Bolivia. (Balzan). Si avvicina all'*E. Alfaroi* con cui ha comune la forma del capo, con angoli posteriori più sporgenti che negli *E. nitens* [*pertyi*], ma non acuti come nell'*E. Sumichrasti*, e il torace gracile, col dorso del metanoto un poco più basso del promesonoto e lungo più di 2/3 di questo (il metanoto è molto più breve negli *E. nitens* [*pertyi*] e *californicum*). Ne differisce pel peduncolo meno gracile, le antenne più grosse e la colorazione diversa".