

em *angustinode*. Unhas simples. — Brilhante. Mandíbulas com estrias grossas. Cabeça com puncturas esparsas, relativamente grossas, pilosas. Promesonoto irregularmente rugoso, com puncturas grossas que posteriormente são menos numerosas; propleuras brilhantes; mesopleuras e metapleuras densamente pontuadas, subopacas; epinoto rugoso e pontuado. Pecíolo densamente pontuado, postpecíolo brilhante. Pêlos abundantes, eretos, amarelo-claros na cabeça, no corpo e nos apêndices; no gaster misturados com pêlos mais curtos subadjacentes. Coloração castanho-escura, gaster e patas mais amarelados. — Localidade do tipo: Mendes, Estado do Rio de Janeiro. Numerosos exemplares, Prof. H. Eidmann leg. Setembro 1933 (n. 47a). Tipo (n. 7739) no Instituto de Biologia Vegetal [Instituto de Experimentação Agrícola] do Rio de Janeiro. Cotipos na minha coleção".

Neivamyrmex emersoni (Wheeler) ♀

(Taf. 31 Fig. 2-3)

Ecton (Acamatus) angustinode subsp. *emersoni* Wheeler, 1921 p. 311 (Arbeiter; Kartabo, B. G.).
Neivamyrmex emersoni, Borgmeier 1953 p. 19.
Ecton (Neivamyrmex) angustinode subsp. *haskinsi* Weber, 1943 p. 68, fig. 1 (Arbeiter; Trinidad: Slopes of Morne Bleu). [nov. syn.]

Cotype: Arbeiter (MCZ; Coll. N. A. Weber; CTB), von Kartabo, Brit. Guiana; W. M. Wheeler leg. Juli-August 1920.

Arbeiter. — (Cotype). Länge 2,8 mm. Kopf (Taf. 31 Fig. 3): Breite 0,6 mm, Länge 0,72 mm, Seiten wenig konvex, Occipitalecken nicht ausgezogen. Augen klein aber deutlich. Mandibeln (Fig. 3a) kurz und breit, Länge 0,4 mm, Basalzahn sehr stumpf, undeutlich; Basalrand kurz, mit dem Kaurand keine deutliche Ecke bildend, Kaurand mit sehr kleinen Zähnchen auf der oberen Hälfte. Fühler (Fig. 3d): Scapus über die Augen reichend (in Fig. 3 etwas zu kurz gezeichnet), Länge 0,44 mm; Geissel 1 mm, Glied 3-8 etwas breiter als lang. Thorax (Fig. 3b): Länge 1,04 mm, Breite 0,44 mm. Pronotum mit Querkiel. Epinotalsutur undeutlich; im Profil ist der Beginn des Epinotiums kaum erkennbar; absteigende Fläche kurz, konkav und gerandet. Petiolus (Fig. 3b-c): Länge 0,28 mm, Breite 0,18 mm; anteroventraler Zahn sehr kurz. Postpetiolus schwach trapezförmig, Länge 0,2 mm, Breite hinten 0,18 mm. Gaster 0,8 mm, Breite 0,52 mm. Hinterschenkel 0,68 mm, Hintertibiae 0,68 mm. — Glänzend. Kopf und Thorax zerstreut punktiert, glatt; Mesopleuren und Epipleuren fein längsgestreift; die