

die Kopfmitte reichend. Zahne der Mandibeln gut entwickelt. Geisselglieder 2-10 quer. Epinotum wenig tiefer liegend als das Epinotum, hinten stark zusammengedrueckt, Sutur obsolet. Petiolus ungefaehr doppelt so lang wie breit; Postpetiolus wenig laenger als breit. Punktierung des Epinotums feiner als beim maior.

Weibchen und Maennchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Surinam, Brit. Guiana, Brasilien (Goiás).

Untersuchtes Material. — Surinam: Paramaribo [Buenzli; Cotopen]; Lelydorp [Geiskses 20.V.38, im Nest von *Atta cephalotes*]. Brit. Guiana: Kamakusa [Long II.1923]. Brasilien, Goiás: Campinas [Schwarzmaier 28.XII.33].

Diskussion. — *N. postangustatus* scheint mit *compressinodis* verwandt, bei der das Epinotum ebenfalls hinten seitlich zusammen gedrueckt ist; leider liegen von letzterer nur kleine Arbeiter vor. *N. postangustatus* ist viel heller gefaerbt, staerker glaenzend, und der Postpetiolus ist beim minor kuerzer als bei *compressinodis*. Die Mandibeln sind auch verschieden; bei *postangustatus* ist der Basalrand konkav, bei *compressinodis* gerade.

Biologie. — Der Entdecker der Art, Dr. Buenzli, gibt folgende Notiz: "An Stoecken von *Caladium bicolor* vorkommend, wenn von *Aphis* befallen; Wurzelbefall durch *Rhizoecus* bleibt aus". Dr. Geiskses (Paramaribo) fand die Art in einem Nest von *Atta cephalotes* L.

Originalbeschreibung

Eciton (Acamatus) postangustatum Borgmeier (1934). — "Esta especie nova difere de *E. angustinode* subsp. *emersoni* Wheeler, 1921, *E. hetschkoii* Mayr, 1886 e espécies afins pelo epinoto posteriormente muito estreitado e comprimido. — Operário. Comprimento 2-3,3 mm. Cabeça mais comprida do que larga, anteriormente um pouco mais larga do que atrás, lados convexos, bordo posterior ligeiramente côncavo, ângulos occipitais agudos, pouco protraídos. Mandíbulas com o ápice pontudo, um dente obtuso na margem basal e alguns dentículos pequenos na margem apical. Carenas frontais aproximadamente retas, vistas de perfil, anteriormente salientes, estreitamente arredondadas. Clípeo anteriormente reto. Escapo alcançando o nível dos olhos, fúnículo robusto. Foveas antennais com carena lateral. Olhos pequenos e indistintos, representados por uma mancha não pigmentada. Promesonoto, visto de cima, aproximadamente duas vezes mais comprido que largo; visto de perfil, duas vezes mais comprido do que a base do epinoto, ligeiramente convexo. Epinoto distintamente deprimido, base de perfil, aproximadamente reta, face declive abrupta, quase vertical, de perfil, côncava; vista de cima, a face basal é um pouco mais comprida que anteriormente larga, e na metade posterior, fortemente estreita-