

da (lateralmente comprimida). Pecíolo, visto de cima, duas vezes mais comprido que largo, lados quase paralelos; visto de perfil, ligeiramente mais comprido que alto, face anterior, ligeiramente côncava, linha dorsal convexa; face ventral reta, denticulo antero-ventral ausente. Postpecíolo, visto de perfil, mais alto que comprido; visto pelo dorso, mais largo do que o pecíolo e posteriormente mais largo que anteriormente, com os lados convexos. Mandíbulas fortemente estrioladas. Cabeça e promesonoto brilhantes. Cabeça com pontos finos esparsos, promesonoto com pontos ligeiramente mais grossos, no operário maior às vezes com rugas indistintas. Parte superior das mesopleuras e epinoto densamente reticulado-pontuados, mates; a mesma escultura se acha na base e na face ventral do pecíolo. Resto do corpo brilhante, inclusive o escapo; funículo subopaco. Pêlos eretos, amarelo-claros, esparsos na cabeça, no corpo e nos apêndices. Coloração amarelo-vermelha; pecíolo, gastro e patas mais pálidos. — A descrição se baseia sobre numerosos operários provenientes de Paramaribo. Tipo no Instituto de Biologia Vegetal [Inst. de Experimentação Agrícola, Rio de Janeiro] (Nr. 7578). Paratípos na minha coleção. Nota: "An Stoecken von *Caladium bicolor* vorkommend, wenn von *Aphis* befallen; Wurzelbefall durch *Rhizoecus* bleibt aus". (Buenzli)"

Neivamyrmex adnepos (Wheeler) ♀

(Taf. 31, Fig. 4, a-d)

Ectiton (Acamatus) adnepos Wheeler, 1922b p. 2 (Arbeiter; Port of Spain, Trinidad, B.W.I.).

Neivamyrmex adnepos, Borgmeier 1953 p. 5, 18.

Ectiton (Acamatus) marginatum Borgmeier, 1939a p. 414 (Arbeiter; Hamburgfarm, Costa Rica).

Ectiton (Neivamyrmex) marginatum, Borgmeier 1948a p. 198 (S. José, C. Rica).

C o t y p e n : Arbeiter (AMNH; MCZ; CTB), von Port of Spain, Trinidad, B.W.I., W. M. Wheeler leg.

A r b e i t e r . — *Maior* (von Hamburgfarm, C. R.): Laenge 3,2 mm. Kopf (Taf. 31 Fig. 4) laenger als breit, Breite 0,84 mm, Laenge 0,92 mm, Seiten deutlich konvex, Hinterrand etwas konkav, Ecken stumpf. Augen undeutlich. Mandibeln 0,4 mm, Basalzahn deutlich, Basalrand schwach konkav, Kaurand mit 2 Zahnen: einem auf der Mitte, einem andern auf der Ecke zwischen Kaurand und Basalrand. Stirnleisten vor den Fuehlergruben keine Lamelle bildend. Fuehler (Fig. 4c): Scapus kurz, kaum bis zum Niveau der Augen reichend, Laenge 0,44 mm; Geissel schlank, 1,08 mm, Glied 2-10 laenger als breit. Thorax (Fig. 4a): Laenge 1,2 mm, Breite 0,52 mm, Laenge des Mesonotums 0,76 mm, Laenge der Basalflaeche des Epinotums 0,36 mm. Pronotum mit deutlichem Querkiel. Promesonotum deutlich konvex. Epinotalsutur tief, etwas krenuliert. Epinotum