

of the head, incrassate apically; first funicular joint a little longer than broad, succeeding joints, especially the basal, strongly transverse, the ninth and tenth nearly as long as broad, the terminal twice as long as broad and blunt at the tip. The three last joints really form a club. Thorax narrow, laterally compressed; the pro- and mesonotum together three times as long as the base of the epinotum, very feebly and evenly convex, the pronotum with a strong transverse carina just behind the neck. Mesoepinotal constriction feeble but distinct; epinotum small, its base, apart from the constriction, continuing the dorsal curve of the pro- and mesonotum and separated on each side from the short and concave declivity by a small angle; the sides of the declivity submarginate. Petiole about one and one-half times as long as broad, very convex above, with a large blunt protuberance at its anterior ventral end. Postpetiole slightly broader than long, but little broader than the petiole and less convex above, with a small, acute, transverse anteroventral projection. Gaster smaller than the head, elongate-elliptical. Legs rather stout; tarsal claws simple. — Very smooth and shining, except the meso- and metapleurae which are finely punctate and slightly opaque. Mandibles sparsely and finely punctate, piligerous punctures on the remainder of the body very minute and scattered. Hairs pale yellow, uneven, rather short, coarse, moderately abundant, erect or suberect both on the body and appendages. Head and thorax yellowish red; mandibles and meso- and metapleurae darker; petiole, postpetiole, gaster, antennae and legs yellow. — Described from 15 specimens taken from a small army which I found traversing the threshold of one of the fern-houses in the botanical garden at Port of Spain. This minute species is quite distinct from any known to me in nature or from descriptions in the shape of the head, mandibles, pedicel, etc.”.

*Eciton (Acamatus) marginatum* Borgmeier (1939). — “Operário. Comprimento total 1.8-3.3 mm. Cabeça mais comprida que larga, posteriormente um pouco estreitada, bordo posterior côncavo, lados convexos, ângulos occipitais protraídos mas estreitamente arredondados (não dentiformes). Olhos pequenos (uma mancha esbranquiçada), situados mais ou menos no meio dos lados da cabeça. Lâminas frontais curtas, paralelas. Escapo curto, alcançando mais ou menos o meio da frente. Clípeo reto anteriormente. Mandíbulas finamente estrioladas, sem dentes na margem interna. Pronoto anteriormente com carena transversal; promesonoto visto de perfil pouco convexo. Sutura mesoepinotal profunda e larga, crenulada. Epinoto um pouco mais baixo do que o mesonoto; face basal lisa, brilhante, vista de perfil ligeiramente convexa; vista de cima trapeziforme, anteriormente mais larga do que posteriormente, nos lados marginada por uma fina carena; face declive também marginada, de cada lado com uma pequena fóvea em que se alojam os ângulos anteriores do pecíolo. Pecíolo anteriormente na face ventral com um dente obtuso triangular; mais comprido que largo, anteriormente tão largo como posteriormente, em cima convexo. Postpecíolo anteriormente menos largo que o pecíolo, posteriormente um pouco mais largo, aproximadamente tão comprido como largo, arredondado em todos os lados. — Coloração amarelo-vermelhada, patas mais claras. Fortemente brilhante, sómente parte posterior das mesopleuras e as epipleuras reticulado-pontuadas; também face lateral do pecíolo ligeiramente reticulada. Mandíbulas finamente estriadas. Corpo e apêndices com pelos esparsos, eretos, moderadamente compridos, amarelos. — Tipos numerosos operários de Hamburgfarm, Costa Rica, F. Nevermann