

rugosités irrégulières chez les plus grands individus. Tous le reste lisse et luisant. Pilosité dressée jaunâtre, assez épars sur le corps et sur les membres, un peu plus abondante sur les tibias. Pubescence presque nulle. D'un jaune roussâtre avec la tête et le thorax d'un roux jaunâtre. L'ouvrière minima a la tête rectangulaire à côtés faiblement convexes et à largeur presque égale derrière et devant. Son thorax n'est que faiblement réticulé et presque pas convexe en dessus et sa couleur est d'un jaune roussâtre plus uniforme. — Mendoza, Argentine, Bruch (Carette leg.). Cette espèce diffère de l'*angustinode* Em. par la forme des mandibules, par sa tête plus longue et plus étroite, à côtés moins convexes, par ses antennes plus courtes et plus épaisses, par l'angle plus denticulé de l'épinotum et par son polymorphisme moindre. Elle diffère de *planidorsum* Em. par sa sculpture, sa tête et ses noeuds beaucoup plus longs et par son dos qui n'est pas aplati".

### *Neivamyrmex pauxillus* (Wheeler) ♀

(Taf. 33 Fig. 2, a-c)

*Ecton (Acamatus) pauxillus* Wheeler, 1903 p. 93, fig. 1a-b (Arbeiter; Austin, Texas); 1908b p. 412 (Texas: Austin, Paisano Pass). — Emery 1910 p. 25. — M. R. Smith 1942 p. 569, fig. 8; 1951 [in Muesebeck] p. 781. — Creighton 1950 p. 75. *Neivamyrmex pauxillus*, Borgmeier 1953 p. 19.

Cotype: Arbeiter (MCZ; AMNH), von Austin, Texas, Wheeler leg.

Arbeiter. — (Cotype) Laenge (ausgestreckt) 1,8 mm. Kopf (Taf. 33 Fig. 2; Fig. 2b bezieht sich auf das Ex. von Mexico) ein Drittel laenger als breit, Breite 0,32 mm, Laenge 0,48 mm, Seiten sehr wenig konvex, hinten etwas konvergierend, Hinterrand deutlich konkav (in Fig. 2 tritt die Konkavitaet nicht gut hervor, weil der Kopf beim Zeichnen etwas mehr nach hinten geneigt war). Augen fehlend. Mandibel (s. Fig. 8 bei M. R. Smith, 1942): Laenge 0,28 mm, Basalzahn deutlich, Basalrand kurz und konkav, Ecke zwischen Basalrand und Kaurand zahnfoermig. Stirnleisten sehr stark genaehert, vor den Fuehlergruben eine schmale Lamelle bildend (am besten von oben sichtbar). Scapus sehr kurz, etwa dreimal so lang wie breit, Laenge 0,22 mm. Geissel dick, Glied 2-10 quer. Thorax (Fig. 2a) im Profil fast gerade, Laenge 0,54 mm, Breite 0,22 mm, Laenge des Promesonotums 0,34 mm, Laenge der Basalflaeche des Epinotums 0,14 mm. Epinotalsutur obsolet. Petiolus (Fig. 2c, nach dem Ex. von Mexico): Laenge 0,16 mm, Breite 0,11 mm, Seiten von oben leicht konvex; anteroventraler Zahn stumpf.