

shining, especially the head and thoracic dorsum; sides of neck, meso- and metapleurae, together with the ventral surfaces of the petiole and postpetiole, distinctly and evenly reticulate. Mandibles, head and thorax with coarse but scattered piligerous punctures. Body and appendages covered with sparse and rather long, suberect, yellow hairs. Reddish yellow throughout except the mandibles, clypeus, and anterior border of the head which are brownish. — Described from nine specimens taken at Austin, Tex., May 25, 1901; the only occasion on which I have seen this species. The insects were moving along under a stone in a small troop, all the members of which were nearly of the same diminutive size. The species is evidently hypogaeic in its habits like *coecum*, *nitens*, *commutatum*, etc. It may be distinguished from all North American Ecitons by its very small size, and from the species above mentioned by its very long, narrow head and the prominent, rather acute basal tooth of the mandibles. Mexican specimens which I assign to *E. commutatum* Emery [*fallax* Borgm.] have the tooth broad and blunt and the head is fully two thirds as broad as long".

Neivamyrmex: Gruppe IX

Diese Gruppe umfasst nur Maennchen. Vergleicht man die Form der Mandibeln, die Stirnbildung, die Genitalien und das Fluegelgeaeder, so findet man ueberall Aehnlichkeiten, die aber auf die Arten verschieden verteilt sind. Vier Arten (*latiscapus*, *guyanensis*, *shuckardi* und *lieselae*) fallen durch die charakteristische lange Behaarung der Beine auf. Bei *hopei*, *carinifrons*, *latiscapus* und *guyanensis* sind die Mandibeln wenig gebogen. Mit Ausnahme von *carinifrons* zeigt der Stipes grosse Uebereinstimmung; der Stipes von *latiscapus* ist zwar schlanker, laesst sich aber noch gut mit dem von *guyanensis* homologisieren. Bei allen Arten ist die Cubitalis hinter der Muendung des Nervus recurrens verdickt.

Die Arten dieser Gruppe sind folgende (in der Reihenfolge, in der sie unten abgehandelt werden):

- hopei* (Shuckard)
- carinifrons* Borgmeier
- latiscapus* (Emery)
- guyanensis* (Santschi)
- shuckardi* (Emery)
- lieselae* (Forel)