

abstehenden Haaren. Faerbung rostbraun; Stirn und Occiput schwarz. Fluegel fast hyalin.

Arbeiter und Maennchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Franz. Guiana; Panama.

Untersuchtes Material. — Holotype von Nouveau Chantier, Fr. Guiana [Le Moult]. 1 Ex. von Corazal, C. Z., Panama [VII.1912; USNM].

Diskussion. — *N. guyanensis*, von Santschi als Varietaet beschrieben, ist sicher eine gute Art. Sie steht *latiscapus* nahe, unterscheidet sich aber durch den breiteren Kopf, den cylindrischen Scapus, die abgerundeten Stirnleisten, den Abstand der Ocellen, die charakteristische Behaarung der Beine, die Form der Genitalien (besonders des Stipes) und das Geaeder.

Variation. — Die Genitalien des Ex. von Panama zeigen kleine Unterschiede in der Bildung der Sagitten (Taf. 48 Fig. 2) und des Stipes (Taf. 48 Fig. 9).

Synonymie. — Santschi kannte offenbar *latiscapus* nicht, als er die "Varietaet" beschrieb; in seiner Sammlung ist *latiscapus* nicht vertreten. Er erwähnt *hospes* Em., die er als Subspecies von *latiscapus* ansieht, die aber mit *spinolai* identisch ist, eine voellig verschiedene Art. — Die var. *nocua* Sant. ist auf die Type von *guyanensis* gegründet, wie ich 1951 mit Ueberraschung feststellte. An der Type steckt ein Zettel mit dem Namen *guyanensis*; im Kasten ist sie mit v. *nocua* bezeichnet.

Originalbeschreibungen

Eciton (Acamatus) latiscapum var. *guyanensis* Santschi (1916). — "Mâle. Long.: 12 mm. Brun jaunâtre, pattes un peu plus foncées. Tête, moins l'épistome, noire. L'abdomen est pubescent comme le thorax, sans longs poils dessous, sauf sous le pédicule. Ceux des pattes sont dispersés sur toutes les faces des membres, sans former de franges comme chez le type. Le funicule est moins délié à son extrémité et le dernier article plus long que le précédent. Le scape n'est pas beaucoup plus épais que la partie la plus épaisse du funicule, un peu moins épais que chez le type. Ailes très légèrement enflumées de jaunâtre, avec les nervures et la tache jaune brunâtres. Pour le reste, comme chez le type. Chez celui-ci, les ailes sont hyalines, et brunes chez la race *hospes* Em. — Guyane française: Nouveau Chantier (Le Moult)".

Eciton (Acamatus) latiscapum v. *nocua* Santschi (1921). — "Mâle. Diffère du type par ses hanches longuement poilues, son gastre pubescent comme le thorax. Sa tête plus large. — Guyane française: Nouveau Chantier (Le Moult)".