

Untersuchtes Material. — 60 Exemplare. Brasil, Ceará: Crato [Mangabeira 4.XI.41]. Goiás: Campinas [Schwarzmaier XII.35, V.37, IX.37, X.37, I.38]; Aragarça [Sick VIII.53]. Mato Grosso: Fazenda Murtinho [Spitz XII.29]. — Paraguay: [Balzan, Cotypen]; Coronel Bogado [Martinez XII.43]. — Argentina, Misiones: Dep. Concepción, S. Maria [Viana 1943]; Pindapoy [Williner I.42]; Loreto [Ogloblin III.36]. Santiago del Estero [Wagner; Nr. 1409 coll. Bruch]; Tintim [Prosen I.39]; Colonia Dora [Prosen X.39]. Mendoza [Januar; coll. André]; [ex coll. Bruch; als *liesetae* determiniert]. Córdoba: Alta Gracia [Bruch 27.I.28]; Dep. Punilla, V. Hermoso [Viana XI.43]; Dep. San Javier, La Paz [Bruch I.29]. Catamarca: Ampajango [Bruch]. La Rioja: Iliar [Gomez XI.34]. Jujuy: Hualco Hondo [Prosen I.51]. San Luis: El Morro [Partridge I.48]. — Bolivia: Cochabamba [Zischka 30.XI.49, 6.XII.49] [Marcus 30.X.49].

Variation. — Die Groesse ist variabel. Die kleinsten Individuen sind von Campinas, Goiás: Laenge 8,5 mm, Kopfbreite 1,36 mm, Fluegel 8,7 mm; aber in Campinas kommen auch groessere Ex. vor. Die groessten Individuen sind von Cochabamba: Laenge 10 mm, Kopfbreite 1,72 mm, Fluegel 11 mm.

Diskussion. — *N. shuckardi*, dem englischen Entomologen William Edward Shuckard (1803-1868) gewidmet, steht *liesetae* sehr nahe und kann leicht mit ihr verwechselt werden. In den Sammlungen von Bruch und Gallardo (Mus. Buenos Aires) fand ich Ex. von *shuckardi* als "*liesetae*" determiniert (ein Ex. von Mendoza war sogar als "Typus" bezettelt!). Bei *liesetae* sind die Mandibeln kuerzer, staerker gebogen und apikal spitzer; die Hintertibie ist so lang wie der Schenkel; der Metatarsus der Mittelbeine ist so lang wie 1/2 Tibie; die Form des Stipes ist verschieden, und die Tibien sind lang abstehend behaart (bei *shuckardi* nur kurz pubescent).

#### Originalbeschreibung

*Eciton (Acamatus) shuckardi* Emery (1900). — "Maschio. Rasmiglia molto all'*E. minus* Cress. con cui ha commune il colore fulvo col capo bruno e la pubescenza; è però più robusto, il capo ancora più corto; anche qui l'ocello laterale dista dall'occhio per uno spazio minore del suo diametro. Lo scapo è più lungo e oltrepassa un poco l'ocello laterale. Il peziolo è notevolmente più largo che lungo, con gli angoli posteriori alquanto rittondati. Il 1° articolo del tarso medio è più corto di metà della tibia corrispondente, quello del tarso posteriore più lungo di mezza tibia. Le ali sono di un giallo molto chiaro, con venatura ferrugineo chiaro, la 2ª cellula cubitale riceve il nervo ricorrente a metà della sua lunghezza, dopo di che la vena cubitale è fortemente ispessita. L. 9-9½ mm.; ala ant. 10 mm."