

slight convexity in the centre of its apex; the apex of the terminal segment less vertical than usual, but much compressed and fissile; the sexual organ protruding in the form of a deeply emarginate plate, the sides of which are acuminate in two prominent teeth, and beneath from the emargination it is canalicated. — In my own collection. This species is from St. Vincent's in the West Indies, where it was collected by the late Rev. Lansdown Guilding, from whose collection I purchased it. It is remarkably distinguished from all the others by the two teeth of the clypeus and the length and slenderness of the antennae, besides other differences".

Neivamyrmex klugii distans Borgmeier (1953). — "Maennchen. Diese Rasse, von mir (1939, p. 416) faelschlich als v. *imbellis* Em. bezeichnet, unterscheidet sich von *klugii* Shuck. durch breitere Stirn, kleinere Ocellen und den groesseren Abstand zwischen den beiden Zahnen am Vorderrand des Clypeus; dieser Abstand betraegt 1/3 des Vorderrandes, bei *klugii* nur 1/4. Genitalien sehr aehnlich. Subgenitalplatte ohne Mittelzahn. Fluegel stark gebraeunt; der Nervus recurrens muendet in die 2. Cubitalzelle etwas vor der Mitte; hinter der Muendung ist die Cubitalis nicht verdickt. Laenge circa 10-11 mm. — Holotype und 7 Paratypen (meine Sammlung) von Hamburgfarm, Sta. Clara Prov., Costa Rica, F. Nevermann leg. 10.V.26; 3 Paratypen (U.S.N.M.), ibidem, 1.-2.VI.26; 2 Paratypen (meine Sammlung) von Tortuguero, C. Rica, Nevermann 28.IV.28; 1 Paratype (U.S.N.M.) von Parismina, C. Rica, 20.VI.25; 4 Paratypen von Barro Colorado Island, Dr. Schneirla leg., 24. u. 26.V.46, 1.II.48 (Coll. Schneirla); 1 Paratype (Coll. Emery) von Bolivien, Staudinger".

Neivamyrmex imbellis (Emery) ♂

(Taf. 40 Fig. 8; Taf. 51 Fig. 15, 18, 24; Taf. 76 Fig. 4)

Ecton (Acamatus) klugi var. *imbellis* Emery, 1900a p. 519 (Maennchen; Peru);
1910 p. 26.
Neivamyrmex imbellis, Borgmeier 1953 p. 7.

H o l o t y p e : Maennchen (Mus. Wien), bezettelt "Peru, Radosz [kowsky], Coll. Mayr".

M a e n n c h e n . — [Holotype] Laenge 9 mm. Kopf (Taf. 40 Fig. 8): Breite 1,56 mm, Hoehe (incl. Clypealzaehne) 0,96 mm, Stirnbreite 0,92 mm. Occiput abgestutzt. Augenlaenge 0,72 mm, Breite 0,6 mm. Ocellen gross, die seitlichen nahe dem Augenrand, Breite des vorderen 0,26 mm, Abstand der hinteren unter sich 0,46 mm, vom Auge 0,08 mm, vom vorderen Ocellus 0,16 mm. Mandibeln schmal, 0,76 mm lang, gleichmaessig