

Neivamyrmex sulcatus (Mayr) ♂

(Taf. 41 Fig. 12; Taf. 43 Fig. 18; Taf. 52 Fig. 4, 10-11, 19-20;
Taf. 77 Fig. 3-4)

Labidus sulcatus Mayr, 1868 p. 168 (Maennchen; Buenos Aires).
Ectiton sulcatum, Berg 1890 p. 19 (Argentina; Uruguay).
Ectiton (Acamatus) sulcatum, Emery 1900a p. 516, 525 (Argentina; Uruguay); 1910
p. 27. — Santschi 1912 p. 326 (Chaco, Santiago del Estero); 1916 p. 368
(Chaco); 1921 p. 92 (Misiones: San Ignacio; Troncal b. Salvina; Mendoza);
1931 p. 74 (Misiones). — Mann 1916 p. 422 (Paraíba). — Gallardo 1920 p.
388, fig. 34 (Mendoza; Pampa central; Córdoba). — Borgmeier 1923 p. 50
(Paraíba).
Ectiton (Labidus) sulcatum, Bruch 1914 p. 216 (Buenos Aires).
Neivamyrmex sulcatus, Borgmeier 1953 p. 9.
Ectiton (Acamatus) richteri Forel, 1913 p. 211 (Maennchen; Misiones, Mendoza).
Ectiton (Acamatus) richteri var. *modificata* Forel, 1913 p. 212 (Rosário, Santa
Fé). — Santschi 1916 p. 368 (Santa Fé: Rio Las Garzas). — Gallardo 1920
p. 390.
Ectiton (Acamatus) iheringi, Santschi 1916 p. 368 (Santiago del Estero) [nec
Forel]. — Gallardo 1920 fig. 35 [p. 392; Ex. von Santiago del Estero, Santschi
det. *iheringi*].

Holotype: Maennchen (Mus. Wien), von Buenos Aires;
Strobel leg. 1866.

Maennchen. — [Ex. von Olivos, Buenos Aires] Laenge
7,5-8,2 mm. Kopf (Taf. 41 Fig. 12): Breite 1,2 mm, Hoehe 0,68
mm, Stirnbreite 0,68 mm. Occiput abgestutzt, Postocularregion im
Profil wenig vortretend. Augen: Laenge 0,52 mm, Breite 0,44
mm. Ocellendreieck erhaben. Ocelle gross, Breite des vorderen
0,24 mm, Abstand der hinteren 0,4 mm, vom Auge 0,08 mm,
vom vorderen Ocellus 0,12 mm. Mandibeln 0,48 mm, dick und
kurz, apikal wenig gebogen und ziemlich stumpf. Stirnleisten vorn
maessig erhaben, geschaerft und genaeht, fast parallel, durch
eine tiefe Furche getrennt; oben vor dem Ocellus stark erhaben
und abgerundet, einen schraegen Kiel bildend, der den seitlichen
Ocellus fast erreicht und vom vorderen Ocellus durch eine tiefe
Furche getrennt ist; dieser Kiel erreicht nicht den Augenrand.
Scapus 0,48 mm, die seitlichen Ocelle erreichend aber nicht
ueberragend. Geissel 2,5 mm, ungefaehr gleichbreit, Glied 1-3
im Verhaeltnis von 2,5 : 3 : 4. Thorax schlank, Laenge 2,4 mm,
Breite 1,2 mm. Scutellum flach, ohne Furche. Postscutellum
vorragend, von oben sichtbar. Basalflaeche des Epinotums relativ
lang, absteigende Flaeche abgestutzt. Petiolus subquadratisch,
Breite 0,8 mm, Laenge 0,68 mm, oben konvex. Beine duenn und
kurz, Schenkel maessig verdickt, Hinterschenkel 0,92 mm, Hinter-
tibiae 0,8 mm, Krallen sehr fein gezaehnt. Fluegel (Taf. 77 Fig.
3-4): Laenge 7 mm, Breite 2,7 mm; Trennungsader zwischen
den beiden Cubitalzellen gebogen; der Nervus recurrens muendet
etwas vor der Mitte, dahinter ist die Cubitalis nicht verdickt.