

hinten verbreitert; im Profil oben wenig, unten stark konvex. Gaster: Laenge 0,64 mm, Breite 0,28 mm, Hoehe 0,2 mm, oben abgeflacht; die Laenge der 3 sichtbaren Tergite nimmt von vorn nach hinten ab. Alle Schenkel verdickt. Hinterschenkel ungefaehr so lang wie der vordere. Schienen zum Apex verbreitert. — Glaenzend. Kopf zerstreut grob punktiert; Thorax und Gaster feiner und spaerlicher punktiert. Behaarung kurz, abstehend, reichlich am Koerper und an den Anhaengen. Faerbung rotgelb, Kopf und Thorax etwas gebraeunt.

Weibchen und Maennchen unbekannt.

Geographische Verbreitung. — Bolivien.

Untersuchtes Material. — 3 Cotyphen von Tumupasa, Bolivien; W. M. Mann leg.

Diskussion. — Die Kopflaenge ist in der Originalbeschreibung uebertrieben, selbst wenn man die Mandibeln einschliesst. Die Tibialsporne der Vorderbeine sind in Mann's Fig. 1A irrtuemlich an den Schenkeln gezeichnet. — Die Form des Kopfes, der schlanke Koerper und der flache Hinterleib zeigen grosse Aehnlichkeit mit *Neivamyrmex pauxillus* Wheel. Die Unterschiede wurden bereits oben angegeben.

#### Originalbeschreibung

*Leptanilloides* Mann (1923). — Worker. Small, slender, monomorphic. Head elongate, subquadrate, anterior portion of front rather strongly impressed. Clypeus short. Frontal carinae very short, fused between the antennae, separated anteriorly and bordering the antennal fossae. Cheeks with a strong carina which projects forward as a blunt tooth. Mandibles with distinct basal and apical portions separated by a rounded angle. Eyes absent. Antennae 12-jointed, stout, scape short, funiculus moderately thickened distally, joints submoniliform. Thorax long, slender and flattened; mesoepinotum compressed laterally; promesonotal impression strong; mesoepinotal impression obsolete. Epinotum unarmed. Petiole subcylindrical, not pedunculate. Postpetiole shorter and broader than the petiole. Gaster long and slender, the three segments visible from above separated by strong constrictions. Legs, long spines of anterior tibiae very strongly pectinate, those of middle tibiae small, of the posterior pair moderately pectinate. Claws simple. — Genotype: *Leptanilloides bicincta*, new species".

*Leptanilloides biconstricta* Mann (1923). — "Worker. Length 1.80-2 mm. Head subquadrate, very slightly narrowed behind, more than twice as long as broad, sides nearly straight and parallel; occipital corners rounded, border feebly concave. Mandibles slender; their blades edentate. Anterior border of clypeus straight. Antennae stout, scapes clavate, extending about three-eights the distance to occipital borders; first funicular joint rounded, broader and longer than the second; joints 2-10 slightly transverse, gradually increasing in size toward apex; terminal joint about as long as the two preceding together. Thorax and epinotum