

Tafel 65

(Eciton: Fluegel)

- Fig. 1. *E. mexicanum latidens* Sant. (St. Jean, Fr. G.) L. 14,5 mm.
 Fig. 2. *Idem*, (Taperinha, Pará) L. 15,5 mm.
 Fig. 3. *E. uncinatum* Borgm. (Holotype; Chimborazo) L. 16 mm.
 Fig. 4. *E. mexicanum morulum* Sant. (Holotype; St. Laurent, Fr. G.)
 L. 14 mm.
 Fig. 5. *E. mexicanum* Rog. s. str. (Hamburgfarm, C. Rica) L. 13 mm.

Tafel 66

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. jermannii* For. (Itatiaia) L. 18 mm.
 Fig. 2. *N. inca* Sant. (Holotype; Peru) L. 20 mm.
 Fig. 3. *N. pertyi* Shuck. (Crato, Ceará) L. 14,5 mm.
 Fig. 4. *N. emeryi* Sant. (Monte Punco, Bolivia) L. 16,5 mm.
 Fig. 5. *N. carinifrons* Borgm. (Holotype; Rio de Janeiro) L. 16 mm.

Tafel 67

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. legionis* F. Sm. (Itatiaia) L. 12,7 mm.
 Fig. 2. *N. pseudops* For. (Córdoba, Arg.) L. 12,7 mm.
 Fig. 3. *N. maxillosus* Em. (Holotype; Rio Manicoré) L. 12,2 mm.
 Fig. 4. *N. falciferus* Em. (Ouanary, Fr. G.) L. 12 mm.
 Fig. 5. *N. scutellaris* Borgm. (Paratype; Panama) L. 12 mm.

Tafel 68

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. pilosus mexicanus* F. Sm. (Tamasunchale, Mex.) L. 12 mm.
 Fig. 2. *N. pilosus mandibularis* M. R. Sm. (Kits Peak, Arizona) L.
 12,5 mm.
 Fig. 3. *N. pilosus* s. str. (Angra dos Reis; Cotype v. *porrectognathus*)
 L. 12 mm.
 Fig. 4. *N. pilosus* subsp. (Bolivia, Chapará) L. 13,5 mm.

Tafel 69

(Neivamyrmex: Fluegel)

- Fig. 1. *N. longiscapus* Borgm. (Paratype, C. Rica) L. 13 mm.
 Fig. 2. *N. diana* For. (Goiás) L. 12 mm.
 Fig. 3. *N. andrei* Em. (Tampico, Mex.) L. 11,5 mm.
 Fig. 4. *N. humilis* Borgm. (Costa Rica) L. 8 mm.