

tivement court et épais; le rapport entre la largeur de la tête et la longueur du scape est de 3,21; le funicule compte 10 articles, qui tous portent des menus poils dressés.

Absence d'yeux à facettes; seule une très petite fossette allongée, superficielle en marque l'emplacement; les ocelles sont rudimentaires; tandis que l'ocelle central n'est plus qu'une faible impression, les deux autres sont extrêmement indistinctes.

Les mandibules sont falciformes, larges à la base, ils s'amincissent insensiblement; leur bord intérieur est lisse et garni de poils dressés.

Le thorax est relativement étroit, n'ayant guère plus de la moitié de la largeur de la tête. Seule la suture pro-mésosotale est nettement tracée. Le mésosotum est plus long au centre que sur les côtés; sa suture antérieure en arc concave, sa suture postérieure en arc convexe. Le métanotum est étroit; il a la même couleur que le reste du thorax; une petite fossette rugueuse se trouve au milieu de sa suture antérieure; vu du côté gauche, le métanotum présente une trace rudimentaire d'aile. L'épinotum est plus ou moins rectiligne, un peu

---

FIGURE 1. *Dorylus (Anomma) kohli* Wasmann, morphotype. République du Congo, Mayidi, 27/II/1959, A. Raignier leg. (Coll. van Boven, 2517).

- a. La reine, vue latérale. Les derniers articles des tarsi sont absents à toutes les pattes. Les stigmates abdominaux sont oblongs et étroits. Le gastre représente 64% de la taille. Taille environ de 29,5 mm.
- b. La reine, détails de la tête, du thorax et du pétiole. Le sillon frontal, divisant la tête en deux lobes, est très visible. L'épinotum est un peu plus large que le pronotum; seule la suture promésosotale est bien marquée. Les angles postérieurs du pétiole sont divergents et plus ou moins pointus.
- c. Tête de l'ouvrière major. La tête est plus ou moins rectangulaire avec une ponctuation très éparsée. Le rapport entre la longueur de la tête et la longueur de la mandibule est de 1,67.
- d. Tête de la reine, vue d'en haut. Les bords latéraux sont convexes; le scape est relativement court; les mandibules falciformes; les angles occipitaux rentrants.
- e. La reine, l'hypopygium vu d'en haut. A l'avant, les bords latéraux sont repliés vers le haut et se terminent en une saillie pointue.
- f. Pygidium de la reine, vu latéralement. Les deux dents du bord postérieur de l'épipygium sont dirigées vers le bas. L'hypopygium est incliné obliquement vers le bas (caractère du sous-genre *Anomma*).
- g. L'hypopygium de la reine, vu ventralement. La fente médiane est large et triangulaire; les ailes de l'hypopygium se terminent en angle aigu.