

élargi sur les côtés et plus large que le reste du thorax; son bord postérieur est rectiligne sur les côtés et convexe au milieu.

Vu de côté, le pro- et métanotum portent un petit stigmat ovale, tandis que le stigmat de l'épinotum est grand et oblong. Les sutures entre le pro-, méso-, et métasternum et les coxæ portent une rangée de poils de couleur d'or.

Les derniers articles des tarsi font défaut à toutes les pattes.

Le pétiole est plus large que long, beaucoup plus large en arrière qu'en avant; son bord antérieur légèrement concave; les bords latéraux sont faiblement convexes et prolongés en arrière en une forte dent divergente, plus ou moins pointue; le bord postérieur très convexe au centre. Vu de côté, le pétiole porte un stigmat nettement oblong.

Gastre allongé et large, ayant cinq segments visibles; la partie basale du premier segment porte en son milieu une échancrure légèrement triangulaire.

Le bord postérieur de l'épipygium, déprimé en son centre, porte une échancrure semicirculaire, prolongée vers l'arrière par deux saillies triangulaires, dirigées vers le bas.

L'hypopygium plus allongé que l'épipygium, porte au centre une incision large et triangulaire, qui pénètre environ jusqu'à mi-profondeur; les ailes de l'hypopygium se terminent en angle aigu; vu de dessous, l'hypopygium a la forme d'une lame large, assez rétrécie en arrière et divisée longitudinalement par la fente médiane; vue d'en haut la face supérieure de l'hypopygium n'est que partiellement visible, puisqu'elle est à moitié recouverte par l'épipygium.

A l'avant, les bords latéraux sont repliés vers le haut et se terminent en une saillie pointue. Les deux crêtes longitudinales centrales sont peu élevées; elles surgissent à la base de l'incision et forment avec les bords latéraux deux sillons larges et plats. Ces deux crêtes centrales se relèvent au bord antérieur en pointes saillantes, dirigées vers l'extérieur. Vu de côté, l'hypopygium forme une plaque orientée vers le bas (caractère propre au sous-genre). Chaque segment du gastre est muni d'un stigmat oblong et étroit.

Tête et thorax (sauf l'inclinaison noire brun de l'épinotum) rouge clair à rouge brun, gastre mordoré (les bords apicaux plus foncés); l'hypopygium rouge brun foncé; les antennes et les pattes jaunes, à l'exception des tharses, tachetés de noir.