

Tête, thorax et gastre à ponctuation espacée, satinés, hormis l'hypopygium qui est mat.

La tête, le thorax et l'abdomen sont glabres, sauf le clypéus, le funicule, le bord intérieur des mandibules et les sutures coxales.

Longueur près de 29,5 mm; tête longue de 3,3 mm et large de 4,2 mm; thorax long de 5,3 mm et large de 2,9 mm; pétiole long de 1,9 mm et large de 4,4 mm; gastre long de 18,6 mm et large de 6,3 mm; longueur de l'hypopygium 2,8 mm.

Comparaison avec d'autres reines *Anomma* (tableau I)

On retrouve toutes les caractéristiques du sous-genre *Anomma* chez la reine de *kohli*, car l'épinotum est plus large que le pronotum, l'épipygium est échancré en demi-cercle et l'hypopygium est plus large à la base qu'à l'extrémité apicale, tandis que, vu de côté, il est orienté vers le bas.

S'il est vrai que la reine de *kohli* présente une ressemblance étroite avec celle de *Dorylus nigricans burmeisteri* var. *molestus*, elle en diffère pourtant par des caractères propres.

DES DIFFÉRENCES AVEC *molestus*

- a. Chez *kohli*, le sillon frontal est profond et court du sommet de l'aire frontale jusqu'au vertex; elle divise le crâne en deux moitiés. Chez *molestus*, le sillon frontal n'est profond que jusqu'à l'ocelle central; superficiel sur le vertex et l'occiput.
- b. Les mandibules de *kohli* s'amincissent insensiblement, celles de *molestus* s'amincissent rapidement un peu avant leur milieu.
- c. La suture entre métanotum et épinotum est vague chez *kohli* et nettement tracée chez *molestus*.
- d. Le bord antérieur du pétiole est légèrement concave chez *kohli* et convexe chez *molestus*.
- e. Chez *kohli* l'épipygium fait saillie en arrière et son bord postérieur porte au milieu une échancrure semicirculaire, munie de chaque côté d'une épine saillante, orientée vers le bas. Le bord postérieur de l'épipygium de *molestus*, peu profondément échancrée en demi-cercle, est simplement concave; il ne porte pas de dents aux extrémités.