

anterior. Los escapos alcanzan exactamente el borde occipital. Las mandíbulas son ligeramente estriadas y armadas de 4 dientes. El pronoto es convexo, un poco más ancho que largo, más estrecho atrás y los ángulos anteriores redondeados. El mesonoto es también convexo, un poco más largo que ancho, más angosto hacia atrás. El metanoto es todavía más angosto que el mesonoto, tectiforme; de perfil la parte basal del epinoto es un poco más corta que la parte declive que es muy oblicua y en su separación no hay espina dirigida hacia arriba ni hacia atrás, sino el ángulo solo formado por el encuentro de los dos planos. El pedículo es casi tan largo como el epinoto, con la escama baja, dirigida hacia adelante, lanceolada y terminada por un solo ángulo bastante agudo.

La cabeza es luciente, con una muy fina reticulación en los costados bastante semejante á la del abdomen. El tórax tiene una reticulación pequeña y fuerte, un poco menos pronunciada sin embargo en las pleuras. La cara declive del epinoto y la escama por encima, son lisas con una reticulación casi nula. Algunos pelos delante del epinoto; pubescencia extremadamente fina. Negro. Antenas y patas parduzcas; mandíbulas y casi todo el escapo ferrugíneos.

El doctor Ángel Gallardo, á quien gustoso dedico la especie, ha encontrado el único ejemplar de que dispongo en Alta Gracia (prov. de Córdoba).

***Dorymyrmex exsanguis* For.**

Encontrado en varios ejemplares ♂ y ♀ en Alta Gracia (prov. de Córdoba) por el doctor don Ángel Gallardo.

***Dorymyrmex tener* var. *pallidipes* Brèthes, n. var.**

♂ Diffère du type par sa taille un peu moindre (3^{mm}3) et par la coloration qui au corps étant d'un roux assez clair, est plus claire, testacée, aux pattes, scape et mandibules.

♂ Difiere del tipo por su talla menor (3^{mm}3) y por la coloración que siendo pardirroja en el cuerpo, es más clara, testácea en las patas, escapo y mandíbulas.

Dos ♀ de la provincia de La Rioja, obtenidos por el doctor don G. Rovereto.