

notum. Le scutellum vu d'en haut est en trapèze légèrement plus large en avant avec quelques impressions obliques de chaque côté du milieu et dirigées vers l'arrière en V. Le segment médiaire est finement chagriné, à profil (latéral) progressivement arqué vers l'arrière, avec deux impressions médianes longitudinales. Le pétiole abdominal est de la forme de celui de l'ouvrière, mais non comprimé, régulièrement arrondi en haut et sur les côtés. L'abdomen a un chagriné (les lignes généralement transversales) microscopique.

D'un nid recueilli à Fuerte del Pantano (province de La Rioja), le 14 avril 1914, par l'expédition E. Boman : il y a des larves avec des ouvrières, mâles et femelles.

Forelius nigriventris For.

♀ (*adhuc ignota*). Cum ♂ concolore, sed mesonoto in medio macula V-formante fusca plus minus distincta, et abdominis segmentis 3 primis apice albescente marginatis. Long. corp. : vix 5 mm.

La femelle de *Forelius nigriventris* For. correspond bien à la description de l'ouvrière dont elle diffère par une tache brune en forme de V au mésonotum, par les 3 segments de l'abdomen dont le bord est blan-




Fig. 4. — Femelle de *Forelius nigriventris* For. augmentée environ 15 diamètres.

châtre et sa grandeur qui est double, mesurant presque 5 millimètres.

En plus du fin duvet dont tout le corps est orné, mais spécialement l'abdomen, il y a des poils courts dressés en général sur tout l'insecte. Le bord du clypéus porte une demi-douzaine de poils longs.

Les mandibules ont 5 fortes dents à leur extrémité, leur surface est marquée de gros points enfoncés; le clypéus est presque lisse, largement sinueux à son bord antérieur; la tête est à peu près carrée, son bord postérieur légèrement excavé. La distance des yeux au bord