

Durante muchos años, estos insectos quedaron casi del todo olvidados, hasta que el doctor Silvestri volvió á ocuparse de ellos : mientras que permaneció entre nosotros (1898-1900), juntó cantidad de especies que recién en 1905 fueron descritas por el profesor Emery de Bologna. El número de nuestras hormigas, con esto, aumentó más del doble de las que conocía Berg.

Recientemente, Schrottky ¹ enumera 101 especies, pero no hace figurar todas aquellas publicadas por Emery.

Los estudios realizados por el profesor Forel con el material que le proporcioné, permiten actualmente formarse un concepto más claro de la fauna mirmecológica de nuestro país, representada por 42 géneros y 289 especies, con sus correspondientes subespecies y variedades ; cifras que han de aumentar, dado el empeño con que se dedica á estos himenópteros el distinguido director del Museo Nacional de Buenos Aires, y por otra parte, con las investigaciones que prometo proseguir.

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer á todas las personas citadas en este catálogo por su valioso concurso, agradecimiento que hago extensivo al doctor Forel, por su inestimable tarea en la determinación.

Fam. **FORMICIDAE**

Subfam. **PONERINAE**

Acanthostichus Mayr (1887)

Kirby Em. Zool. Jahrb., Syst. 8, 1895, p. 751, fig. Chaco, Salta.
serratulus (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. Misiones (Posa-
111, ♀ (*Typhlopone*). das).

Typhlomyrmex Mayr (1862)

pusillus Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. Buenos Aires,
141, pl. 1, f. 2, ♀; XXXVII, 1905, p. Tucumán.
111, ♀.
Rogenhoferi Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Misiones.
XII, 1862, p. 737, ♀; ibid. 1887, p. 538,
♀, ♂.

¹ SCHROTTKY, CURT. *La distribución geográfica de los himenópteros argentinos en Anales de la Sociedad Científica Argentina*, tomo LXXV, páginas 143-144 y 180-190. Buenos Aires, 1913. Esta enumeración comprende las especies descritas hasta 1909.