

(*Labidus*) *sulcatum* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 10, ♂. * Buenos Aires.

Subfam. **MYRMICINAE**

Atta F. (1804)

- levigata* Sm. var. *saltensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 35. * Salta.
- subsp. *Vollenweideri* (Forel), Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 588, ♀, ♀, ♂ (*A. sexdens* L. subsp. *Vollenweideri* Forel). * Rosario de Santa Fe, Salta, Santiago del Estero.
- sexdens* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 581, ♀, ♀, ♂. * Santa Fe, Tucumán, Misiones.

Acromyrmex Mayr (1865)

- ambigua* (Em.) Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. 358, ♀ (*Atta Lundii* var. *ambigua* Em.). Misiones.
- coronata* F. subsp. *subterranea* (Forel), Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 1901, p. 301, ♀. * Misiones.
- lobicornis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. 358, ♀. * Córdoba, San Luis, Catamarca, Misiones, Chubut.
- var. *ferruginea* Em. Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120. Mendoza, Misiones.
- Lundi* (Guér.) Voy. Coquille, Zool., II, 2, 1830, p. 206, ♀, ♂. * Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut.
- var. *pubescens* Em. Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 119, f. 20, ♀.
- var. *bonariensis* (Em.) Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120 (*A. pubescens* var. *bonariensis* Em.). Buenos Aires.
- var. *Risii* Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 350, ♀. * Buenos Aires, Córdoba, Catamarca.
- subsp. *decolor* (Em.) Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120 (*pubescens* subsp. *decolor* Em.). Tucumán.
- nigra* (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 186, ♀ (*Oecodoma*). * Buenos Aires.