



Tetramorium reticuligerum sp. n. (I) и *T. concaviceps* sp. n. (II), А — ♀ в профиль; Б — ♀, вид сверху; В — ♀ в профиль; Г — петиоль и постпетиоль ♀, вид сзади; Д — ♀, вид сверху; Е — петиоль и постпетиоль ♂, вид сзади; Ж — скапус ♀; З — петиоль и постпетиоль (для II — только петиоль) ♀, вид сзади; И — ♂ в профиль; К — ♂, вид сверху

Окраска темная, варьирует от черно-коричневой до коричневой, брюшко окрашено темнее головы и торакса. Длина от 2,8 до 3,6 мм.

Самка (рисунок, I, Б, В, Г). Голова трапециевидная, сужается к передней части, длина ее равна ширине, затылочный край очень слабо вдавлен или прямой, бока слабо выпуклые; скапус и усиковые ямки как у рабочего; наличник в профиль выпуклый, слегка выступает над поверхностью головы. Торакс высокий, скutum и скутеллум приподняты над эпинотумом, плечи пронотума выступают из-под скутума; основная поверхность эпинотума наклонена по отношению к верху торакса под углом 45° , шипы развиты хорошо, метастеральная лопасть образует на вершине прямой угол. Петиоль в профиль треугольный, немассивный, наверху имеет полукруглую вырезку (рисунок, I, Г), неширокий (ширина торакса: ширина петиоля = 2,64 и 2,50).