

тиц.—♂ из того же гнезда. Паратипы: 5 ♂♂ и 8 ♀♀, 15.VI 1978, № 109 (Бурсаков). Хранятся в коллекции Зоологического музея МГУ.

Описание. Рабочий (рисунок, II, А, Д, Ж, З). Голова прямоугольная, немного длиннее своей ширины. Затылочный край равномерно вогнутый, вогнутость незначительная, вполне заметна только у крупных особей, у мелких затылок почти прямой; затылочные углы довольно резко закруглены; бока головы слабовыпуклые, около глаз почти прямые; глаза маленькие (длина глаза: длина головы = $6,12 \pm 0,32$); скапус обычного строения; наличник в профиль не выступает над поверхностью головы, передний край его очень слабо выгнут, почти прямой. Торакс коренастый (ширина пронотума: ширина эпинотума = $1,28 \pm 0,04$), шипы развиты, мезоэпинотальное вдавление отсутствует. Эпинотум высокий, покатая поверхность эпинотума наклонена по отношению к общей верхней поверхности торакса примерно под углом 40° , метастеральные лопасти закругленные. Узелок петиоля в профиль угловатый, довольно массивный, наклонен назад (высота узелка: высота цилиндрической части = $1,93 \pm 0,05$).

Хетотаксия развита средне, отстоящие щетинки не длинные; на голове, если смотреть сверху, видна только пара затылочных щетинок; на I тергите брюшка они не длинные, расположены друг от друга на расстоянии, равном их длине или чуть большем. Скульптура развита слабо, поверхность тела в общем довольно гладкая и блестящая; на боках головы и в передней ее части имеются неглубокие продольные морщинки, на лбу и на висках они реже и сглаженные, между морщинками на висках имеется слабо выраженная сетчатость; бока торакса сетчатые, с редкими морщинками; сглаженные ячейки на основной поверхности эпинотума ориентированы в продольные или поперечные ряды; членики стебелька с боков сетчатые, сверху гладкие; I тергит брюшка часто почти совсем гладкий, лишь с малозаметными звездочками зачаточной сетчатости, реже он бывает весь покрыт сглаженной сетчатой скульптурой.

Окраска светлая, желто-коричневая. Длина 3,3—3,7 мм.

Самка (рисунок, II, Б, В, Г). Голова трапециевидная, сужающаяся к низу, удлинённая (длина: ширина = 1,1); затылочный край равномерно широковогнутый, затылочные углы резкие, острозакругленные; бока слегка выпуклые, около глаз прямые; наличник спереди равномерно выгнутый. Торакс низкий, верх его относительно плоский; эпинотум, skutellum и skutum составляют единую слабовыпуклую поверхность; плечи пронотума довольно значительно выступают из-под skutума; шипы хорошо развиты, толстые и тупые; метастеральные лопасти острые, на вершине шиповидные. Узелок петиоля в профиль треугольный, массивный, сверху слегка вдавлен (рисунок, II, Г), неширокий (ширина торакса: ширина петиоля = 2,6).

Хетотаксия на голове и тораксе как у рабочего, эпинотум голый или со щетинкой около дыхальца, расположенной спереди и выше его; на I тергите брюшка щетинки имеются у основания и в один ряд по его заднему краю. Голова покрыта морщинками, между которыми расположены сглаженные ячейки; на лбу и на щеках морщинки правильные, неглубокие, ближе к темени и на висках скульптура сглаженная, морщинки здесь прерывистые; на верху головы хорошо видны довольно крупные ямки с прилегающими щетинками. Основная поверхность skutума с крупными и редкими морщинками, передняя часть и бока его гладкие; skutellum в центре гладкий, по краям с редкими штрихами и точками; эпинотум тонко ячеисто-морщинистый; членики стебелька ячеистые, сверху гладкие; брюшко более гладкое, чем у рабочего, звездочки зачаточных ячеек реже.

Окраска светло-коричневая, брюшко немного светлее головы и торакса. Длина 5,7 мм.